かゆいドライスキンに

尿素20%



販売名: メンソレータム® ADクリーム20

第3類医薬品 乾燥性皮フ用薬

AD20シリーズは、かゆみをスーッと鎮めることを追求した メンソレータムADシリーズの処方をベースにしながら、 さらに、尿素を20%配合することで かゆみの原因からケアしていくことを目指した アンチ・ドライ スキンケアシリーズです。

こんな方に……

- ●ひざ下などが乾燥して、白く粉をふいている方。
- ●暖房などで足元が暖まると、 乾燥部位がかゆくなる方。
- ●セーターやストッキングの摩擦などで、 乾燥部位がかゆくなる方。

こんな使い方がおすすめ……

入浴後が効果的 お風呂に入り、皮フの血行・吸収性が 高められた上で乾燥しやすいところに 塗りこんでいただくと効果的です。

かゆみをスーッと鎮めるだけでなく、その原因となる ドライスキンを改善してしっとりなめらかな素肌をつくります。

原 因 ドライスキン [乾燥肌]

尿素20%(角質軟化剤)

高い保湿効果で乾燥した皮フに水分を集め、逃さないようにして皮フをやわらかくします。

トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体) 血行を促進して、皮フの 生まれ変わりを活発にします。



クロタミトン(鎮痒剤)

かゆみをすばやく、しっかり止めます。

ジフェンヒドラミン(抗ヒスタミン剤) かゆみのもとであるヒスタミンの作用を止めます。

グリチルリチン酸モノアンモニウム(抗炎症剤) 炎症をしずめ、かゆみのもとを抑えます。 かくことで起こした皮フの炎症もしずめます。

使用上の注意 🔨

してはいけないこと 💢

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1.次の部位には使用しないでください。
 - (1)目や目のまわり、粘膜等
 - (2) 引っかき傷等のきずぐち、亀裂(ひび割れ)部位
 - (3)かさぶたの様に皮フがはがれているところ
 - (4) 炎症部位(ただれ・赤くはれているところ)

相談すること



- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この 説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮フ	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(いたみ、熱感、ヒリヒリ感)、はれ、 かさぶたの様に皮フがはがれる状態、かぶれ、乾燥感

3.2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤 師又は登録販売者にご相談ください。

効能·効果

かゆみをともなう乾燥性皮フ(老人・成人の乾皮症)

用法・用量

1日数回、適量を患部にすりこんでください。

<用法及び用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を守ってください。
- (2)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児 (15歳未満) には使用させないでください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部のみに使用し、基礎化粧等の目的で顔面には 使用しないでください。

成分(1g中)

尿素・・・・・・200mg クロタミトン・・・・・50mg ジフェンヒドラミン・・・・・10mg グリチルリチン酸モノアンモニウム・・・・5mg トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体) 添加物として、 ℓ -メントール、スクワラン、パルミチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、ステアリン酸グリセリン、セトマクロゴール、セタノール、d ℓ -ピロリドンカルボン酸Na、pH調節剤、グリシン、トリエタノールアミンを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 本剤のついた手で目や粘膜に触れないでください。
- (2) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、 一度開封した後はなるべく早くで使用ください。

お問い合せ先;お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHT○ □-ト製薬株式会社 大阪市生野区異西1-8-1