ピカリスム。

健胃消化整腸薬

苦しいおなかのハリ 胃と腸を動かしてラクにする

胃腸を 動かす カルニチン塩化物

腸を整える 乳酸菌

膨満感・便通リズムの改善に効く <販売名>パンシロンビオリズム健胃消化整腸薬 1回2錠 1日3回 30 錠 食後又は就寝前に

第3類医薬品

客さま安心サポートデスク

お気軽にご相談ください。 東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230 受付時間 9:00~18:00 (土. 日. 初日を除く)

-切り取り線

吸湿しないように、服用のつどチャックをしっかりしめること

苦しいおなかのハリ・もたれ 胃と腸を動かして効く!

【効能・効果】整腸(便通を整える)、腹部膨満感、便秘、軟便、胃部・腹部膨満感、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化不良、消化促進、食欲不振(食欲減退)、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・寒酔のむかつき、喝気、悪心)、嘔吐

♠ 使用上の注意

剤相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登 録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレ ルギー症状を起こしたことがある人
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は 副作用の可能性があるので、直ちに服 用を中止し、この袋を持って医師、薬剤 師又は登録販売者に相談すること。

関係部位 症状 皮ふ 発疹・発赤、かゆみ

3. 2週間位服用しても症状がよくならない 場合は服用を中止しての袋を持って医師、 薬剤師又は登録販売者に相談すること。 【用法・用量】次の量を1日3回、食後又は 就寝前に水又はお湯で服用してください。 成人(15才以上)・・・・1回2域、15才未満は 服用しないこと 〈用法・用量に関連する 注意〉用法・用量を厳守すること

【成分・分量】(1日量6錠中)カルニチン塩化物600mg、ラクトミン(乳酸菌ワェカリス菌の45mg、パメチルポリシロキサン36mg、パントデン酸カルシウム・タイプS 46.2mg(パントテン酸カルシウムとして30mg、銅クロロフィソントリウム40mg、ピオデアスターゼ2000 90mg、プロザイム6 30mg、リパーゼAP12 60mg、添加物として、セルロース、D・マンニトール、乳酸カルシウム、メタケイ酸アルミン酸Mg、クロスカルメロースNa、ヒドロキシブロビルセルレース、スクラロース、ステアリン酸Mg、&・メントル、香料、緑茶末、*本剤の機とは銅クロロフィリンナトリウムと緑茶末によるものです。

【保管及び取り扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4) 湿気により、変色など品質に影響を与える場合があるので、ぬれた手で触れないこと。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後はなるべく早く使用すること。

製造販売元:□□□□製薬株式会社

大阪市生野区巽西 1-8-1 お客さま安心サポートデスク 06-6758-1230



期限 製造 番号

使用