



第②類医薬品
水虫・たむし用薬
【販売名】メンソレータムエクシブEXスプレー

△ 使用上の注意

■ してはいけないこと (やらないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 人は使用しないこと 本剤又は本剤の成分によりアルギン症状を起きたことがある人。

2. 次の部位には使用しないこと (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、喉等)、陰部、外陰部等

(2) 湿疹(ただし、電気や外傷のひどい部位)

■ 相談すること

1. 人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けていたる人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 乳幼児 (4) 痢などによりアルギン症状を起したことがある人 (5) 眼部が敏感又は広範囲の人 (6) 患部が化膿している人 (7) 「湿疹」か「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」かはつきりしない人 (8) 他のうにかゆみ・だれ等の症状がある場合は、温疹等他の原因による場合が多い)

2. 使用後、次の症状があわせられた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、本剤を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

皮膚のかゆい、刺激感、熱感、鱗屑・落屑(リケ、アカ)のようないわ皮(のはれ)、たれ、乾燥(つぱり感)、皮脂の増多(ぬめり)、色素沈着、発発赤(かゆみ)、はれ、(じみ)

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、本剤を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能】水虫、いんきんたむし、ぜにたむし
【用法・用量】1日1回、適量を患部に噴霧する
<用法・用量に関する注意>

■ (1) 定めた用法を厳守すること (2) 患部やその周囲がちりめん状使用しないこと (3) 目に入らないよう注意すること。万一に入らぬ場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること (5) 外用のみ使用すること (6) 本剤について子供や粘膜(くもく)に触れないと (7) 使用前によく振ること (8) 患部まで10cmの距離で噴霧すること。なお、噴霧口をよく確かめ、顔面特に目に向けて噴霧したり、吸入しないこと (9) 亂用などの恐れがあるので、同じ箇所に連続して1秒以上噴霧しないこと

☆ 出を横向に使用しないこと

【成分・分量】(原液) 100g 中

テルナフラン塩酸塩···1.0g、イソプロピルメチルフェニール···1.0g、クロロフェニラミンマレイン酸塩···0.5g、クロタミト···1.0g、リドカイン···2.0g、グリセリン酸···0.5g

添加物 DME、トウロココナツオブン、二酸化ケイ素、アビガイセラソノブリ、タルク、セスキオレイン酸(リビタソ、エクソード、香料)

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと (4) 本剤は合成樹脂等を軟化したり、塗料を溶かすことがあるため、家具や床等につかないようにすること (5) 火気近くにつけないなど

■ 本品は缶の外側を透明フィルムで包んでいます。

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てる。

高圧ガス:DME

● 本品はフロンガスを使用しています 内容量: 60g 原液 13.5ml 火気厳禁

● 腹器器具(ファヒーター等)の周囲は、温度が上がり破裂する危険があるので置かないこと

●捨てるときは、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押してガスを抜き、捨てる

ロート製薬株式会社 TEL:06-6758-1230 アルミ缶/プラスチック外装フィルムキャップ

大阪市生野区箕面西1-8-1 受付時間 9:00~18:00(土日、祝日を除く) 使用期限: 缶底に記載