



第2類医薬品 Eczema, Rash, and Anti-Itch Lotion

販売名：メンソレータム®カブレーナ®乳液
〈皮ふ炎・湿疹用薬〉

繰り返してしまう

かゆみ・かぶれを治して正常なお肌に

Point.1 痛がゆいかぶれにWのアプローチ

かゆみを
素早く鎮める

(ジフェンヒドラミン)

非ステロイド
かゆみの元の
炎症も治す

(ウフェナマート) (グリチルレチン酸)



Point.2 デリケート部位を考えた処方

蒸れなどにより
繁殖する菌を殺菌

(イソプロピルメチルフェノール)

刺激を感じやすい
薄い皮膚の修復促進※

(トコフェロール酢酸エステル)

気になる二オイを考えた
爽やかな香料使用

※血行を促進することによる作用

発売元：ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

製造販売元：ジャパンメディック株式会社

富山県富山市横越168番地

△ 使用上の注意

■ してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 湿潤やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感(ヒリヒリ感)、熱感、乾燥感

3. 1～2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

MADE IN JAPAN 15g

副作用被害救済制度の問合せ先
0120-149-931

押して開ける

効能・効果 湿疹、皮ふ炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、おむつかぶれ

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみご使用ください。
- (4) 患部を清潔にした後、ご使用ください。

有効成分 (100g中)ウフェナマート5g、ジフェンヒドラミン1g、グリチルリチン酸0.3g、トコフェロール酢酸エステル0.5g、イソプロピルメチルフェノール0.2g
添加物として、ステアリン酸ポリオキシル40、ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(4)セチルエーテル、モノステアリン酸グリセリン、ステアリン酸、セトステアリルアルコール、パルミチン酸セチル、ミリスチン酸イソプロピル、トリイソオクタン酸グリセリン、 α -オレフィンオリゴマー、カルボキシニルポリマー、1,3-ブチレンジグリコール、ジイソロパノールアミン、pH調節剤、香料を含有する。

ロート製薬 お客さま安心サポートデスク

東京：03-5442-6020
大阪：06-6758-1230
受付時間9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

