

*2014年1月改訂

服用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名:パンシロンキュアa 胃腸薬

すっきり
服用感

ストレス・飲み過ぎによる 胃痛・胸やけに

パンシロン[®]キュア^a

第2類医薬品

こんな状況下によく効きます



空腹時によく
グューッと痛む



ムカムカする
胃の不快感に



製品の特徴

ストレスやアルコールなどによって胃に負担がかかると、胃酸が出過ぎて、胃酸の逆流が起こりやすくなります。

「パンシロンキュア」は胃酸の出過ぎや胃酸の逆流などで起こる胃の痛み、胸やけといった胃の不快症状に3つの作用でアプローチし、胃酸から胃を守りながら痛み・胸やけを和らげる胃腸薬です。

胃粘膜の
保護作用

出過ぎた胃酸の
中和作用

胃酸分泌
抑制作用



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください。
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人*
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある)
4. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 授乳中の人
(3) 高齢者
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5) 次の症状のある人
排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人
緑内障、腎臓病、甲状腺機能障害

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、胃部膨満感
循環器	動悸
泌尿器	排尿困難
その他	目のかすみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる
無顆粒球症*	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる*

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
便秘、下痢、口のかわき

4.2週間間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

■効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)、胃痛

■用法・用量

次の量を食前又は食間の空腹時に水又はお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	1包	3回
15才未満	服用しないこと	

*食間とは…食後2～3時間をさします。

(用法・用量に関連する注意)

(1)用法・用量を厳守してください。

■成分・分量(1日量3包中)

有効成分	配合量
水酸化マグネシウム	450mg
合成ヒドロタルサイト	780mg
沈降炭酸カルシウム	900mg
ホップ乾燥エキス-Q	33.2mg(ホップとして471.5mg)
アルジオキサ	150mg
ピレンゼピン塩酸塩水和物	46.9mg

添加物:キシリトール、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、炭酸水素ナトリウム、アスパルテム(L-フェニルアラニン化合物)、トコフェロール酢酸エステル、ℓ-メントール、香料

■保管及び取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

O-ト製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

401312202