

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。眼科用薬

お子さまの目のかゆみ・結膜充血に

第3類医薬品

ロートアルゲート® 子どもクリア

たいせつなお子さまの花粉などによる目のかゆみに

●花粉などによるお子さまのつらい目のかゆみ、充血に

アレルギーの原因物質の放出を抑制し、炎症を鎮める「グリチルリチン酸二カリウム」、ヒスタミン（アレルギー原因物質）をブロックし、かゆみを抑える「クロルフェニラミンマレイン酸塩」を配合し、目のかゆみや充血を抑えます。

●目のかゆみに心地よい、しみにくい処方設計

目のかゆみに心地よいやさしいさしごこち。涙に近いpHの目薬です。

●無香料・無着色

●防腐剤無添加※

3つの作用で、つらい症状を改善！

かゆみ を抑える

クロルフェニラミン
マレイン酸塩

アレルギー原因物質を
ブロック

炎症 を鎮める

グリチルリチン酸
二カリウム

アレルギー原因物質の
放出を抑制

修復 サポート

ビタミンB6
栄養を補給する

L-アスパラギン酸カリウム
細胞の呼吸を促す

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる

フリーアングルノズル®



簡単にアイ
ケアできて、
とっても便
利です。

ワンタッチ式スクリューキャップ



開ける時は左に
1回カチッと回し、
閉める時も右に
1回カチッと回す
だけ。簡単便利です。

目薬を上手にさしてみよう！



- ①
まず
手を洗って
清潔に



- ②
片手で
あかんべえ
をする



- ③
まつ毛や
まぶたに
ふれないように
目薬をさす



- ④
約1分間
目を閉じる

使用上の注意

相談すること



1 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 次の症状のある人…はげしい目の痛み (4) 次の診断を受けた人…緑内障

2 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- 関係部位 症状

皮ふ 発疹・発赤、かゆみ

目 充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合 (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

目のかゆみ、結膜充血、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかすみ(目やにの多いときなど)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、目の疲れ、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

15才未満 1回1~3滴、1日5~6回点眼してください。

●用法・用量に関する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみご使用ください。



容器の先と
目やまつ毛が
ふれることの
ないように

成分・分量

有効成分	配合量	添加物
グリチルリチン酸二カリウム	0.1%	ホウ酸、ホウ砂、ハッカ油、エデト酸Na、ポリソルベート80、pH調節剤
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03%	※防腐剤(ベンザルコニウム塩化物、パラベン)を配合していません。
ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩)	0.05%	
L-アスパラギン酸カリウム	0.2%	

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40°C以上)に放置しないでください。
- (2) キャップを閉める際は、力ちつとするまで回して閉めてください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5) 他の人と共用しないでください。
- (6) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとてご使用ください。
- (8) 容器に他の物を入れて使用しないでください。
- (9) 誤用をさけるため、使用済みの空容器は捨ててください。



お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230
受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

401396001