



錠剤タイプ



120錠

30回分(15才以上)

原寸大

ツラレス

満量処方

芍薬甘草湯
芍薬甘草湯
しゃくやくかんぞうとう

足や指のつり こむらがえりに



ずっと
立ち仕事…



就寝中
足が…



冷えからの
つり…



〈販売名〉ツラレス

筋肉の緊張をほぐし、つらい痛みやこわばりをしっかり鎮めます。

【効能・効果】体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症:こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

第2類医薬品



満量処方とは、
日本薬局方芍薬甘草湯の
生葉全量(最大量)から
エキスを得た処方です。

切り取り線

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとしめること

漢方製剤 120錠

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の診断を受けた人は服用しないこと:心臓病 2. 症状があるときのみの服用にとどめ、連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人 (2)妊娠又は妊娠していると思われる人 (3)高齢者 (4)次の症状のある人:むくみ (5)次の診断を受けた人:高血圧、腎臓病
2. 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる
うつ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる

3. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【用法・用量】次の量を1日2~3回、水又はお湯で服用すること。

年 齢	1回量
成人(15才以上)	4錠
7才以上15才未満	2錠
7才未満	服用しないこと

<用法・用量に関する注意>

- (1)用法・用量を厳守すること。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】12錠中 芍薬甘草湯エキス2400mg(シャクヤク6.0g、カンゾウ6.0gより抽出)を含む。添加物として、クロスCMC-Na、パレショニデンプン、メタケイ酸アルミニウムMg、乳糖水和物、タルク、ステアリン酸Mg、カルナウバロウを含む。※本剤は、天然物(生薬)のエキスを用いているため、錠剤の色が多少異なることがある。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること。(2)小児の手の届かないところに保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)湿気により、変色など品質に影響を与える場合があるので、ぬれた手で触れないこと。(5)使用期限を過ぎた製品は、服用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後はなるべく早く使用すること。

アンケート ご協力のお願い



アクセス番号をお控えの上、
携帯電話またはパソコンで
アクセスしてください。

<https://jp.rohto.com/qrcode/>

【アクセス番号】
0051

副作用被害救済制度の問合せ先
0120-149-931

お客様安心サポートデスク

東京:03-5442-6020

大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

使用
期限

製造
番号

ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

