

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また必要な時に読めるよう保管してください。



かさつく肌のかゆみ治療薬

鎮痒消炎薬

メンソレータム<sup>®</sup>  
AD

クリームm

第2類医薬品

## かさつく肌のしつこいかゆみに！

皮フが乾燥すると、角質層の水分や皮脂が減少して皮フが敏感になり、  
外からのさまざまな刺激によってかゆみが起こりやすくなります。

「メンソレータムADクリームm」は、お風呂や布団に入って体が温まった時や、  
下着でこすれたときなどに、かかずにいられないかゆみをすばやくスーッとすめます。  
保湿成分を配合した、しっとりとした使用感のクリームです。

## ADクリームの働き

「メンソレータムADクリームm」は、**3つのかゆみ止め成分**（クロタミ  
トン、リドカイン、ジフェンヒドラミン）の働きで、しつこいかゆみをすばやくしずめ  
ながら、かゆみが起こりにくい肌へと改善していきます。

### ● ビタミンE 誘導体

血行を促進し、  
患部の治りも  
助けます。

### クロタミトン

温感神経に働き、  
かゆみを軽減し  
ます。

### リドカイン


かゆみ神経の働き  
を弱めます。

### ジフェンヒドラミン

かゆみの原因であ  
るヒスタミンの作用  
を止めます。

### ● グリチル レチン酸

炎症をしずめ、  
かゆみのもと  
を抑えます。



かゆみをしっかり抑えて  
かゆみの起きにくい肌へ！

### ● こんなかゆみに…

- ・入浴後など、からだが温まったときのかゆみ
- ・おやすみ前のがまんできないかゆみ
- ・衣服がすれて起こるかゆみ

乾燥しやすいスネ、背中、腕などに  
一日数回塗り伸ばしてください。

### ● こんな時にも…

下着のしめつけや洗剤等によるかぶれ、  
じんましん、虫さされ、その他のかゆみ  
にもお使いください。

# メンソレータムADクリームm 第2類医薬品

## 使用上の注意

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

#### 1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等
- (2) 傷のあるところ

### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 湿潤やただれのひどい人

#### 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感

#### 3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

## 効能・効果

かゆみ、皮膚炎、かぶれ、じんましん、虫さされ、しっしん、ただれ、あせも、しもやけ

## 用法・用量

1日数回、適量を患部にぬってください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

## 成分 (1g中)

クロタミトン.....50mg トコフェロール酢酸エステル.....5mg  
リドカイン.....20mg (ビタミンE誘導体)  
ジフェンヒドラミン.....10mg グリチルレチン酸.....2mg

●添加物として、流動パラフィン、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、尿素、ステアリン酸グリセリン、トリエタノールアミン、パルミチン酸イソプロピル、セトマクロゴール、乳酸Na、カルボキシビニルポリマー、セタノール、コレステロール、*l*-メントール、塩化Mgを含有する。

ステロイド成分を配合していません。

## 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

### お問い合わせ先: お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになつてのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京: 03-5442-6020 大阪: 06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

**ROHTO** **ロート製薬株式会社**  
大阪市生野区巽西1-8-1

401236001