



おしりのトラブルに...

リシーナ®

坐剤

痔の痛み・出血・はれ・かゆみに

第2類医薬品

人にはなかなか相談できず、ひとりで悩んでしまいがちな痔。

「痔」に関する情報が盛りたくさん！ロートくらぶへアクセスしてみてください！

<http://www.rohto.co.jp/club/karada/hc006>痛みはないけど  
便器やティッシュに血が...排便してもなんだか  
スッキリしない...

## ☆肛門内側のはれやいぼ痔(内痔核)などに

内痔核は、肛門内側の静脈の血流が悪くなり、うっ血していぼのように腫れた状態です。感覚神経が通っていない為、軽症時は痛みを感じませんが、排便時に便がこすれて出血してしまうことも。

こんな痔の症状を感じたら、がまんをせずに早めに治すことが大切です。

メンソレータムリシーナ坐剤Aは

「つらい痔の諸症状を効果的に治す」ことを目的に作られた痔のお薬。

抑える

消炎成分が  
炎症を抑えます。

ヒドロコルチゾン酢酸エステル

酸化亜鉛

Q-メントール

はれ・ただれ等の  
炎症を抑えます

鎮める

痛みを止める成分

Wで配合!  
つらい痛みを  
しっかり鎮めます。

アミノ安息香酸エチル

リドカイン

つらい痛みとかゆみを  
しっかり鎮めます

改善する

傷ついた組織を修復し、  
ビタミンE誘導体が血流を促進。  
いぼ痔の主な原因である  
うっ血を改善します。

インプロビルメチルフェノール

患部を殺菌し、細菌の感染を防ぎます

アラントイン

傷ついた組織を修復します

トコフェロール酢酸エステル

血行を促進し、うっ血を改善します

◆手で直接触れることが  
できない肛門内側(直腸側)の  
患部に、有効成分を  
ダイレクトに届けます。◆溶けやすく、  
スルッと入れやすい  
ミニサイズの坐剤。ミニ  
サイズ肛門外側などの  
患部には、  
直接塗れる  
メンソレータム  
リシーナ軟膏A

第2類医薬品

肛門内側・外側  
両方に見える  
メンソレータム  
リシーナ注入軟膏A

第2類医薬品



使用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名:メンソレータムリシーナ坐剤A

【痔疾用外用薬】第②類医薬品

## ⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください。  
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 患部が化膿している人
2. 長期連用しないでください。

### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。  
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
そ の 他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症 状 の 名 称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 10日間位使用しても症状がよくならない場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

## 効能・効果

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

## 成 分

1個(1.0g)中

有効成分	配合量
アミノ安息香酸エチル	40mg
リドカイン	48mg
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	5mg
酸化亜鉛	100mg

添加物として、ハードファットを含有する。

有効成分	配合量
l-メントール	5mg
イソプロピルメチルフェノール	2mg
アラントイン	10mg
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体)	50mg


## 用法・用量

右記の量を肛門内に挿入してください。

年 齢	1回量	1日使用回数
15才以上	1個	3回まで
15才未満	使用しないこと	


### 【用法・用量に関連する注意】

- <1>用法・用量を厳守してください。
- <2>本剤が軟かい場合は、しばらく冷やした後に使用してください。  
また、硬すぎる場合には軟かくなった後に使用してください。
- <3>肛門にのみ使用してください。



## 保管及び取り扱い上の注意

- <1>直射日光のあたらない、1~30℃の湿気の少ない涼しいところに、坐剤の先を下向きにして保管してください。(軟化した時、坐剤の変形を防ぐことができる) また、冷凍庫など0℃以下の低温で保管した場合、まれに坐剤にひび割れを生じる場合がありますので、0℃以下の低温保存は避けてください。
- <2>小児の手の届かないところに保管してください。
- <3>他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- <4>使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。



### お問い合わせ先:ロート製薬お客様安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに届けたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

発売元 **ロート製薬株式会社**  
大阪市生野区巽西1-8-1

製造販売元 **中外医薬生産株式会社**  
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5