

## ▼ セルフチェックシート ▼

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある	YES	使用しないでください。
女性である	YES	使用しないでください。(本品は男性用です。)
20歳未満である	YES	使用しないでください。(本剤での未成年における有効性及び安全性は確認されていません。)
頭髪が簡単に抜けてしまったり、脱毛の部分が円形や楕円形で、脱毛部分にうぶ毛がない。	YES	使用しないでください。(壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性があります。)
急激に脱毛している。	YES	使用しないでください。(壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性があります。)
下図のような症状の脱毛・薄毛ではない。 	YES	使用しないか、使用する前に、医師又は薬剤師にご相談ください。(壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性があります。)
家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人はない。	YES	使用しないか、使用する前に医師又は薬剤師にご相談ください。(壮年性脱毛症以外の要因による脱毛症の可能性があります。)
高血压、低血压で現在治療を受けている。 狭心症等、心臓に障害がある。	YES	使用を控えられることをおすすめします。 使用する場合は、必ず、医師又は薬剤師にご相談ください。(本剤は血压に影響を及ぼす可能性が考えられます。)
甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)の診断を受けている。	YES	使用する前に、医師又は薬剤師にご相談ください。(甲状腺疾患による脱毛の可能性があります。)
薬や化粧品などによりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことがある。 高血圧又は低血压である。 心臓や腎臓に障害がある。むくみがある。	YES	使用する前に、医師又は薬剤師にご相談ください。(副作用の発現率が高くなる可能性があります。)
65歳以上である。	YES	使用する前に、医師又は薬剤師にご相談ください。(一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなります。)
頭皮にきず、湿疹あるいは炎症(発赤)がある。	YES	きず、湿疹あるいは炎症(発赤)を治してから再確認してください。(きず等を悪化させることができます。)
上記のいずれにも該当しない	YES	使用上の注意や製品/パッケージに記載された事項をよくお読みになり、ご購入ください。

\*本人によっては、本剤の使用により適用部位の皮膚症状(副作用)が現れることがあります。特にミノキシジル5%製剤はミノキシジル1%製剤よりも「皮膚」への副作用(頭皮の発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、しびれ、使用部位の熱感等)が起こりやすい可能性があります。これらの症状が現れた場合は使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してその指示を受ける必要があります。

※ご不明な点がございましたら、薬剤師にご相談ください。

第1類医薬品 販売名：リグロ EX5

効能・効果

壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防。

リグロEX5は壮年性脱毛症に効く  
第1類医薬品です。

リグロEX5は、下図のような症状の脱毛・薄毛に効果があります。



※脱毛範囲が図示以上の場合、  
効果が得られない可能性があります。

用法・用量

成人男性(20歳以上)が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布してください。

成分・分量

100mL中  
ミノキシジル····· 5.0g  
添加物: エタノール、プロピレングリコール、1,3-ブチレングリコール、酒石酸

【注意】本剤は男性用です。女性はお使いになられません。

商品に添付している説明書をよく読んでからご使用ください。

## 薬剤師の方へ

お客様への説明後、このカードを切り離し、ご購入のお客様へお渡しください。

ご使用に関しては、商品に添付している説明書を  
よくお読みになり、正しくお使いください。

■お名前

■ご購入記録(薬剤師記入欄) ※このカードはご記入されたご本人のみが有効です。

	ご購入年月日	ご購入薬局・薬店名	薬剤師印
1	年　月　日		
2	年　月　日		
3	年　月　日		
4	年　月　日		
5	年　月　日		
6	年　月　日		