



【メディカルミスト】

こんな大人のニキビに悩んでいませんか？


- ✓ アゴや口周りなど、フェイスラインに出来る
- ✓ 生理前やストレスを感じる時などに、繰り返し出来る
- ✓ 同じ場所に出来て、痕が残りやすい

使いやすい「ミストタイプ」




【ニキビのできるメカニズム】

※「アクネ菌の巣」とは、アクネ菌同士が好んで集まっているかたまりのこと。



アクネ菌のバイオフィルムへの働き

アクネ菌が形成するバイオフィルムにより殺菌剤によっては効果を発揮しにくくなります。
 殺菌成分：イソプロピルメチルフェノールは、バイオフィルムを壊してアクネ菌を殺菌し、ニキビの進行をおさえます。



ニキビを治す3つの効果

1 殺菌(イソプロピルメチルフェノール)

アクネ菌などを殺菌し、ニキビにしっかり効きます。

2 抗炎症(アラントイン)

できてしまったニキビの炎症・赤み・はれをしずめます。傷ついた組織を修復する効果もあります。

3 角質軟化作用(サリチル酸)

角質軟化作用で古い角質を取り除き、つまった毛穴を開きます。

うるおい成分
 配合

オイルフリー

【アクネス25シリーズ】



ポイント使いにクリームタイプ
 メンソレータム®アクネス25
 メディカルクリームc

第2類医薬品 16g



フェイスラインにも使いやすい
 ローションタイプ
 メンソレータム®アクネス25
 メディカルローションb

第2類医薬品 100mL



背中にも使いやすい
 ミストタイプ
 メンソレータム®アクネス25
 メディカルミストb

第2類医薬品 100mL

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名：メンソレータムアクネス25メディカルミストb

第2類医薬品

ニキビ治療薬

100mL

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないでください。

目や目の周囲

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 患部が広範囲の人
(4) 湿潤やただれのひどい人 (5) 深い傷やひどいやけどの人
(6) 硬結(硬いしこり)のある重症の人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

- 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- その他
(1) 本剤は傷口があると、しみる、ヒリヒリする等の一過性の刺激があらわれることがあります。刺激が気になる場合は、使用を中止してください。
(2) 本剤の使用により、皮膚が多少乾燥したり、赤みがさしたりすることがあります。そのときは使用を一時中止してください。再び使用するときは間隔をあけて使用してください。

【効能・効果】

ニキビ

【用法・用量】

1日2回(朝・晩)、適量を患部に噴霧してください。

顔に使用する場合は、適量を手にとり、患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 使用前に腕の内側などに少量を塗布して一晩そのままにしておき、翌朝、塗布部位に過敏症状(発疹・発赤、かゆみ等)があらわれた場合は使用をお避けください。
- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

【成分】

| 有効成分 | 分量 |
|----------------|------|
| インプロピルメチルフェノール | 0.3% |
| アラントイン | 0.2% |
| サリチル酸 | 0.5% |

添加物として、1,3-ブチレングリコール、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート20、エドト酸Na、L-アルギニン、クロロブタノール、トリエタノールアミン、ニコチン酸アミド、香料を含有します。

【保管及び取扱上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- 冷所に保管すると結晶が析出することがありますので、0℃以下での保管はお避けください。
- 火の近くでの使用および保管はお避けください。
- 衣服、寝具、家具、床等につかないように十分ご注意ください。
(材質によっては落ちにくいことや変色することがある)

お問い合わせ先；お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020/大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)