

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。



管理コード
512078A1



メンソレータム[®] アレピット

乾燥性皮ふ治療薬


第2類医薬品

乾燥荒れ肌の原因の一つは、肌構造が乱れて肌のバリア機能が弱まり、水分が蒸散してうるおいを保てなくなっているから。

「メンソレータム[®] アレピット」は、

有効成分のヘパリン類似物質が乾燥荒れ肌などの症状をしっかり治す治療薬です。きちんと治すことで、バリア機能の正常化につながります。乾皮症、小児の乾燥性皮ふに。

有効成分 ヘパリン類似物質 ~ラメラ構造を修復し 乾燥荒れ肌を治す~




ラメラ構造が整った肌(イメージ図)

●ラメラ構造とは

肌の最も上にある角質層の油分と水分がミルフィーユのように重なった層のこと。ラメラ構造が規則正しく並び安定している肌は、水分を抱え込んで外に逃がさないよう調節し、肌のバリアの役割を果たします。この構造が崩れた乾燥荒れ肌は、見た目の印象や手触りも悪くなります。

●ヘパリン類似物質は3つのメカニズムで保湿し、乾燥荒れ肌をしっかり治します。



ラメラ構造が乱れた肌(イメージ図)

1. ダメージを受けて壊れた
肌のラメラ構造を修復

2. 角質層の
天然うるおい因子を増加

3. 優れた吸湿力で、角質層に
水分を保持

デリケートな顔に7つのこだわり処方

- 非ステロイド
- ノンメントール
- ワセリンベース
- 無香料
- 尿素無配合
- アルコールフリー
- 無着色



鼻や口まわりなどの乾燥にも使える

おやすみ前にも



高密着
ワセリンベース処方



マスク擦れによる
乾燥にも

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人
- (2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人
(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがある)

2. 次の部位には使用しないでください。

目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻腔、膣など)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 湿潤やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

乾皮症、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手指の荒れ、手足のひび・あかぎれ、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛、小児の乾燥性皮ふ

用法・用量

1日1~数回、適量を患部に擦り込むか、またはガーゼなどにのばして貼ってください。

【用法・用量に関する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみご使用ください。

成分(1g中)

有効成分	配合量	作用
ヘパリン類似物質	3mg	乾燥による荒れ肌に働きかけます。 (保湿・血行促進・抗炎症作用)

添加物として、白色ワセリン、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステルを含有する。

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先: ロート製薬お客様安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

<発売元>

ROHTO ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

<製造販売元>

ジヤパン メディック 株式会社
富山県富山市横越168番地