

使用前にこの説明書きを必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名:ロートCキューブ®アイズクール®a 第3類医薬品 13ml 目薬



⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 次の症状のある人…はげしい目の痛み (4) 次の診断を受けた人…緑内障
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持つ

て医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 目のかすみが改善されない場合 (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

使用前に、この箱内側の説明書きを必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。



用法・用量 1回1～3滴、1日5～6回点眼する。

●**用法・用量に関連する注意** (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないこと。[汚染や異物混入(目やにやほり等)の原因となる]また、湿潤したものは使用しないこと。(3) 点眼用のみ使用すること。(4) コンタクトレンズを装着していないときも使用できる。

効能・効果 ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

成分 塩化カリウム0.03%、塩化ナトリウム0.49%、塩化カルシウム水和物0.01%、タウリン0.2% 添加物として、ポビドン、ヒプロメローズ、ホウ酸、ホウ砂、ヒアルロン酸Na、ポリソルベート80、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、 β -メントール、d-カンフル、塩化亜鉛、クエン酸ナトリウム水和物、pH調節剤を含有する。

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないこと。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 他の人と共用しないこと。(5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。(6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがある。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとって使用すること。(7) 容器に他の物を入れて使用しないこと。

お問い合わせ先: お客さま安心サポートデスク

東京: 03-5442-6020 大阪: 06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00 (土、日、祝日を除く)

ROHTO

ロート製薬株式会社 大阪市生野区巽西1-8-1