

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名:ロートデジアイ

第3類医薬品 目薬 12mL

抗ヒスタミン作用をもつクロルフェニラミンマレイン酸塩配合で、目のかゆみを抑えます。

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 次の症状のある人…はげしい目の痛み (4) 次の診断を受けた人…緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持

て医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 目のかすみ  
が改善されない場合 (2) 2週間位使用しても症状がよ  
くならない場合

用法・用量 1回1～3滴、1日5～6回点眼する。

●用法・用量に関連する注意 (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないこと。〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕また、混濁したものは使用しないこと。(3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。(4) 点眼用にのみ使用すること。

効能・効果 目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

成分 ネオスチグミンメチル硫酸塩0.005%、アズレンスルホン酸ナトリウム0.02%、クロルフェニラミンマレイン酸塩0.03%、ビタミンB<sub>12</sub> 0.01%、タウリン0.10%、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム0.25% 添加物として、ホウ酸、ホウ砂、塩化K、*l*-メントール、*d*-カンフル、*d*-ボルネオール、ユカリ油、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンヒマシ油、ゴマ油、BHT、エドト酸Na、塩酸ポリヘキサニド、pH調節剤

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないこと。使用後はキャップをしっかり閉めて添付のケースに入れ、日光や蛍光灯に当たらないようにして、保管すること。※有効成分のビタミンB<sub>12</sub>とアズレンスルホン酸ナトリウムは光にあ

たると分解して退色する。なお製品の赤紫色は、服などにこぼれても水洗いで簡単に落ちる。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4) 他の人と共用しないこと。(5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。(6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがある。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとって使用すること。(7) 容器に他の物を入れて使用しないこと。

お問合せ先

コミュニケーションコール

0120-610-755

受付時間/9:00～17:00(土、日、祝除く)

ロート製薬株式会社 大阪市生野区巽西1-8-1