

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように保管してください。 **眼科用薬**

販売名:Vロートゴールド40コンタクト

第3類医薬品

つらい目のかすみ・疲れに Vロートゴールド40 コンタクト

20mL

*目やにの多いときなど

◆製品特徴

- ①栄養チャージ成分(タウリン)を基準※内最大濃度配合。年齢などによる眼疲労時の回復力を高める処方です。
- ②目が疲れて夕方見えにくくなる。そんなつらい目の症状にも効果を発揮します。コンタクトレンズ装用中にご使用いただけます。(カラーコンタクトレンズ装用中には使用しないでください。)
- ③目が疲れてリフレッシュしたいときにうれしい、気持ちのいいすっきりとした差し心地

※基準とは厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲

目薬には、ソフトコンタクトレンズ装用中に使用できるものと使用できないものがあります。ソフトコンタクトレンズを装用したまま目薬を使用する場合は、箱や添付文書を確認し、必ず、ソフトコンタクトレンズ装用中に使用できる目薬を使用しましょう。

使用上の注意 ⚠

相談すること

1 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人…はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人…緑内障

2 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみ改善されない場合
- (2) 5~6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

- 目のかすみ(目やにの多いときなど)
- 目のかゆみ
- 目の疲れ
- 紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)
- 眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)
- ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1回1~3滴、1日5~6回点眼してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕
また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) 点眼用にはのみ使用してください。
- (4) コンタクトレンズを装着していないときも使用できます。



容器の先と目やまつ毛がふれることのないように



成分

有効成分	配合量	作用
タウリン	1%	新陳代謝促進作用があり、栄養を補給することで疲れた目の回復を促します。
ネオスチグミン メチル硫酸塩	0.005%	目の調節神経に作用して、ピント調節をスムーズにし、目の疲れに効果をあらわします。
酢酸d- α -トコフェロール (天然型ビタミンE)	0.03%	血行促進作用があり、栄養を送り届けることで疲れた目の回復を促します。
ビタミンB6	0.05%	負担のかかった目の組織代謝を活発にすることで、疲れた目の回復を促します。
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	0.5%	潤いを保ち、角膜を保護し、目の疲れを改善します。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	0.02%	抗ヒスタミン作用で、かゆみなどの不快な症状を改善します。

※添加物として、ホウ酸、塩化Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ホウ砂、塩化K、ポリトン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、エチル酸Na、 β -メントール、d-カンフル、d-ポリネオール、ブドウ糖、塩酸ポリヘキサド、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40°C以上)に放置しないでください。
- (2) キャップを閉める際は、カチッとするまで回して閉めてください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5) 他の人と共用しないでください。
- (6) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても一度開封した後は、保管及び取扱い上の注意に従い、2~3カ月を目安にご使用ください。
- (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (8) 容器に他の物を入れて使用しないでください。



〔捨て方〕 目薬液が残った場合はティッシュ等に染みこませ、処分してください。容器はプラスチックゴミとして各自治体の廃棄方法に従い処分してください。



お問合せ先

製品についてご意見やご要望、
お困りごとやお悩みごとがございましたら、
お気軽にご連絡ください。
あなたのお声におこたえます。



コミュニケーションコール(お客様相談室)

0120-610-755

受付時間/9:00~17:00(土、日、祝除く)

Rohto ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

402302001