



歯槽膿漏による歯ぐきのはれ・痛み・出血に 口内炎にも

## 歯を失う原因となる、歯槽膿漏に挑む。 ～歯をしっかり支える本来の強い歯ぐきのために～

「ハレス<sup>®</sup>口内薬」は弱った歯ぐきで起こる  
歯槽膿漏症状を抑えます。

歯を失わないことを目指し、本来の強い歯ぐきへ  
再活サポート<sup>®</sup>していく歯ぐきのための医薬品です。

### 独自の歯ぐき再活サポート<sup>®</sup>処方

有効成分が患部に働いて、  
歯ぐきを修復(活性化)し、  
歯肉炎・歯槽膿漏の諸症状を緩和します

歯ぐき細胞を活性化して、  
弱った組織を修復していきます

#### 歯ぐきの組織修復 アラントイン

はれ、痛み等の  
症状を鎮めます

抗炎症  
グリチルリチン酸  
二カリウム

歯ぐきの組織  
修復を促します

血行促進  
ビタミンE  
誘導体\*

歯ぐきに  
浸透して効く

殺菌  
CPC\*\*  
ヒノキチオール

ハッカ油、 $\beta$ -メントール配合  
(清涼化剤)

止血作用  
カルバゾクロム

歯周ポケットに潜む  
細菌の増殖を抑えます

歯ぐきの毛細血管を  
強化し、出血を抑えます

\* トコフェロール酢酸エステル

\*\* セチルピリジニウム塩化物水和物

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

●販売名 ハレス®口内薬

歯肉炎・歯槽膿漏薬 第3類医薬品



## 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚・口内	発疹・発赤、かゆみ
その他	味覚異常

3. しばらく使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

### ●効能・効果

歯肉炎・歯槽膿漏における諸症状(歯ぐきの出血・発赤・はれ・うみ・痛み・むずがゆさ、口のねばり、口臭)の緩和、口内炎

### ●用法・用量

- 歯肉炎・歯槽膿漏：1日2回(朝・晩)ブラッシング後、適量(約0.3g／約3cm)を歯ぐきに塗り込んでください。
- 口内炎：1日2～4回、適量を患部に塗ってください。

#### [用法・用量に関する注意]

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 歯科用にのみ使用してください。

### ご使用方法(歯肉炎・歯槽膿漏)

- まず、歯磨きをして口の中を清潔にします
- 指に、本剤を適量(約0.3g／約3cm)のせます
- 口を開いて、歯ぐきに本剤をやさしく塗り込んでください

歯ぐき全体に指でマッサージしながら塗り込むと効果的です

マイルドミントの爽やかな使用感



患部にしっかりと留まる、  
ポリマー配合の密着軟膏

### ●成分・分量(100g中)

アラントイン 0.3g、トコフェロール酢酸エステル 2.0g、グリチルリチン酸二カリウム 0.4g、カルバゾクロム 0.02g、ヒノキチオール 0.1g、セチルピリジニウム塩化物水和物 0.05g

添加物として、ワセリン、流動パラフィン、無水ケイ酸、サラシミツロウ、CMC-Na、マイクロクリスタリンワックス、カルボキシビニルポリマー、ポリエチレン、ハッカ油、メントール、チモール、エドテ酸Na、香料、赤色3号を含有する。

※製剤中に見られる赤い点は成分によるもので、品質に影響ありません。

### ●保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

### お問い合わせ先：お客様安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00 (土、日、祝日を除く)



ロート製薬株式会社  
大阪市生野区巽西1-8-1