

使用前にこの説明書をよくお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。

ひげそり後^{などの}皮ふ炎・湿疹治療薬

メンソレータム[®]



ヒリプロ

第2類医薬品

鎮痒消炎薬

ひげそりやアクセサリーなどによる炎症・かぶれにしっかり効く処方設計


シェーバーやカミソリによって肌がこすれると、ヒリヒリ感やかゆみ、赤く腫れるといった炎症が生じることがあります。

そんな時に「メンソレータム[®] ヒリプロ」。

5つの有効成分が気になる症状にしっかり効いていきます。つらいヒリつきにひんやり伸びのよいクリームタイプ。



5つの有効成分の働き



繰り返しがちな以下のトラブルは、我慢せずに治療薬で早めに治すことが大切です。



- 炎症が起きて肌がヒリヒリする
- 赤みが出る
- ぷつぷつとした湿疹ができる

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

1. 次の部位には使用しないでください。目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】 皮膚炎、かゆみ、かぶれ、湿疹、ただれ、じんましん、あせも、虫さされ、しもやけ

【用法・用量】 1日数回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみご使用ください。

成分・作用 (100g中)

有効成分	配合量	作用
リドカイン	2.0g	ヒリつきを鎮めます。(局所麻酔作用)
ジフェンヒドラミン	1.0g	かゆみの原因に作用。(抗ヒスタミン作用)
グリチルリチン酸二カリウム	1.0g	炎症やかぶれをしっかりと抑えます。(消炎作用)
トコフェロール酢酸エステル	0.5g	患部の治り、修復を促進します。(ビタミンE誘導体)
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	雑菌の繁殖を防ぎます。(殺菌作用)

添加物として、グリセリン、エタノール、ワセリン、ステアリルアルコール、流動パラフィン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パルミチン酸イソプロピル、ステアリン酸グリセリン、ジメチルポリシロキサン、クロロブタノール、カルボキシビニルポリマー、*l*-メントール、*dl*-カンフル、エドト酸 Na を含有する。

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先；お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00 (土、日、祝日を除く)

ROHTO

ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

401236701