

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。



スポーツ後の筋肉・関節をアイシング

消炎鎮痛薬

第3類医薬品


アイ斯拉ブスプレー

アイ斯拉ブスプレーは、スポーツ等による筋肉や関節の疲労・痛みを改善する外用消炎鎮痛剤です。3種類の有効成分が、痛めた部位にすみやかに吸収され、筋肉や関節の痛みとハレをやわらげます。また、スプレータイプなので、すばやく患部を冷却します。スポーツ等による打撲や捻挫、筋肉痛はアイ斯拉ブスプレーで早めになおしましょう。



●筋肉痛に

こんな時、
アイ斯拉ブでアイシング!



●打撲に



●筋肉疲労に



●捻挫に



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

効 能

筋肉疲労、筋肉痛、打撲、捻挫、関節痛、腰痛、骨折痛、肩こり

用法・用量

1日数回、患部に適量をスプレーしてください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 大量・広範囲には使用しないでください。
- (4) 外用にのみ使用し、吸入しないでください。まれに吸入によりめまい、はきけ等の症状を起こすことがありますので、できるだけ吸入しないよう、また周囲の人にも十分注意してお使いください。
- (5) 使用前によく振とうしてください。
- (6) 患部まで10cm離して噴霧してください。
- (7) 同じ箇所連続して3秒以上噴霧しないでください。

成分・分量（150mL中）

- 2-メントール…………… 3000mg（爽やかな清涼感を与え、消炎・鎮痛作用をあらわします。）
 - サリチル酸グリコール…………… 2250mg（皮ふからの吸収が速く、筋肉の消炎・鎮痛作用にすぐれています。）
 - グリチルレチン酸…………… 75mg（急性あるいは慢性の炎症に、おだやかな消炎作用をあらわします。）
- 添加物として、フェニルエチルアルコール、エタノールを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (5) 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。

●容量 150mL

お問い合わせ先；お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00（土、日、祝日を除く）

火気と高温に注意

第二石油類 原薬 30mL DME

ROHTO

ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

400131608