

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。



手湿疹に

メディクイック®

軟膏

かゆくてつらい手湿疹、洗剤かぶれ、割れて痛い皮膚炎に

湿疹・かぶれの治療薬

販売名:メンソレータム®
メディクイック®軟膏R

第2類医薬品

単なる手荒れと思って保湿ケアをしても、 なかなか治らない…こんな症状ありませんか。

洗剤・シャンプーで
かぶれる

水がしみるほど
割れて痛い

小さな水ぶくれや
湿疹ができる

眠れないほど
かゆさが気になる

水仕事や手指を使う作業によって皮膚の油分・水分が奪われ、乾燥症状が悪化すると、外的刺激に負けやすくなり、炎症や湿疹、つらいかゆみなどの症状を引き起こすことがあります。そんな手湿疹や洗剤かぶれを早く治すには、がまんせずに「効く治療薬」で症状をおさえることをおすすめします。



「メンソレータム®メディクイック®軟膏R」は、かゆみや小さなぶつぶつ(水ぶくれ)など、手湿疹のつらい症状に効く治療薬です。

■高い消炎効果のプレドニゾロン
吉草酸エステル酢酸エステル配合
(アンデドラッグステロイド)

患部で優れた効き目を発揮し、
体内に吸収されると低活性に…。

■肌を修復するアラントイン配合

傷ついた肌を修復するアラントイン
他4種の有効成分が効果を発揮。

■患部にしみにくい低刺激性タイプ

イメージ図

かゆみに
クロタミトン&
リドカイン
炎症に
プレドニゾロン
吉草酸エステル
酢酸エステル
肌を修復
アラントイン
患部を殺菌
イソプロピルメチル
フェニール

割れた患部にもしっかり密着する軟膏。保湿性の基剤で、乾燥した患部にも。

治療の コツ

こまめにぬる

特に薬が落ちやすい部位
(手・腕など)には
一日数回ぬり直すと効果的です。

就寝時にじっくり

患部を休めることができ、
薬もとれにくいから、
おやすみ前のご使用は有効です。

・症状が改善するのにともない、メディクイックの使用回数を適宜減らしていきましょう。
また、手湿疹症状の再発を防ぐためには、しっかり保湿ケアを心がけることが大切です。
・症状が治りにくい時、また、慢性的に症状をぶりかえす方は、医師に相談されることをおすすめします。

してはいけないこと 

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等または化膿している患部
 - (2) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等
2. 顔面には広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。

相談すること 

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 患部が広範囲の人
 - (5) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮フ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮フ(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

■効能・効果 湿疹、かぶれ、かゆみ、皮フ炎、じんましん、あせも、虫さされ

■用法・用量 1日数回、適量を患部にぬってください。

●用法・用量に関連する注意

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみご使用ください。
- (5) ラップフィルム等の通気性の悪いものでおおわないでください。

■成分・分量 (1g中)

プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル…1.5mg
 (アンデドラッグステロイド)
 クロタミトン… 50mg
 リドカイン… 10mg
 アラントイン…2mg
 イソプロピルメチルフェノール… 1mg

添加物として、ワセリン、ゲル化炭化水素、バラフィン、ステアリン酸グリセリン、流動パラフィン、パラベンを含有する。

■保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先;お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満点などをお聞かせいただけます。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO ロート製薬株式会社
 大阪市生野区巽西1-8-1