

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。〈目薬〉

ロート ナノアイ 第3類医薬品



「ロート ナノアイシリーズ」は、  
ロート製薬が  
かつてない「極小一滴」に  
こだわって開発した目薬です。

## かつてない気持ちいい、さし心地… それは、極小一滴\*だから!

\*当社製品内で最も小さい  
一滴の目薬です。

ロート独自の製剤技術で、目に点した瞬間、極小の一滴があつという間にサッと広がり、すみずみにまで行き渡ります。それは、未体験の気持ちよさ!

### ロートオリジナル! 極小ノズル

- ・かつてない気持ちよさの極小一滴を実現したノズル。
- ・極小の一滴だから点しやすく、目薬が目からあふれ出ることなく、無駄なく目の中に入ります。



## 疲れ目、爽快にリフレッシュ!

### ロート ナノアイの使い方

#### ① 開ける

容器のわきをもち、キャップを上にして親指でキャップを開けてください。

※容器の中心を押さえて開けると薬液が飛び出してもらえることがあります。




#### ② 点眼する

ノズルの先端を真下に向けて、点眼してください。

※容器を強く押すと、薬液が出すぎる場合がありますのでご注意ください。

※容器を横にして点眼すると、薬液がノズルに付着し、うまく点眼できないことがあります。また、ノズルやキャップ等に付着した薬液が結晶となってあらわれることがあります。その場合は清潔なガーゼなどで軽くふきとってご使用ください。



容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。

#### ③ 閉める

カチッと音がするまでキャップを押し下げてください。



## 使用上の注意

### 相談すること



#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起したことがある人
- (3) 次の症状のある人  
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人  
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

### 効能・効果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

### 用法・用量

1回1～3滴、1日5～6回点眼してください。

#### 用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。  
〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕  
また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用のみ使用してください。

### 成 分

ネオスチグミンメチル硫酸塩……………0.003%  
イブシロン-アミノカブロン酸……………1%  
添加物として、ホウ酸、カルボキシビニルポリマー、エデト酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、*l*-メントール、*d*-カンフル、ペパーミントオイル、プロピレングリコール、ハッカ油、*pH*調節剤を含有します。防腐剤(ベンザルコニウム塩化物、*N*(ラベン)を配合していません。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) キャップを閉める際は、カチッと音がするまでキャップを押し下げてください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5) 他の人と共用しないでください。
- (6) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (8) 容器に他の物を入れて使用しないでください。

※ 薬液中に気泡が留まって見えることがありますが、とろみのある製剤によるものであり、品質には問題ありません。

### お問い合わせ先；お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京: 03-5442-6020 大阪: 06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)