


# フレックスパワー-3000

## コンドロイチン硫酸ナトリウム配合


●ビタミンB1主薬製剤●  
販売名:ロートフレックスパワー3000錠

『ロートフレックスパワー3000錠』は、軟骨構成成分に着目し、「コンドロイチン硫酸ナトリウム」を配合。さらに筋肉・神経のスムーズな働きに必要な「ビタミンB1」や「アスパラギン酸カリウム・マグネシウム」、血流を高める「ビタミンE」を配合した、関節痛や神経痛などの症状を緩和してくれるお薬です。

### 【関節のメメ知識】



関節の骨の表面は「軟骨」で覆われていて、固い骨同士がぶつかり合わないようクッションの役目をしています。この「軟骨」が加齢などによってすり減ると骨同士がぶつかって痛みを生じます。また、筋力低下や痛みによってストレスや運動制限が起こり、「軟骨」の再生が低下し、ますます「軟骨」がすり減るという「悪循環」を繰り返すこととなります。



関節の「軟骨」部分


### 軟骨組成

コンドロイチンは「軟骨」を構成するムコ多糖類の一つで水分を多く含むことで「軟骨」にクッション性をもたせています。骨に大切なのはカルシウムですが、「軟骨」に大切なのはコンドロイチンなどのムコ多糖類です。


### ● 製品の特徴

1. 「コンドロイチン硫酸ナトリウム」を800mg(1日量:9錠中)配合しています。
2. 関節痛や神経痛などの症状を緩和する「ビタミンB1」やその働きを助ける「アスパラギン酸カリウム・マグネシウム」を配合しています。
3. 過酸化脂質の生成を抑制し、血流を良くする「ビタミンE」を配合しています。
4. 胃の中での製剤の崩壊性を高める為に「塩酸グルコサミン」を添加物(製剤の緩衝剤)として配合しています。
5. 飲みやすい小さな錠剤タイプです。

### ● こんな症状が見られるときに




① 階段の昇り降りが  
つらい



② 歩き出すときに  
痛みを感じる



③ 椅子から  
立ちあがりにくい



④ 朝起きると関節が  
こわばった感じがする



⑤ 正座をするのが  
つらい

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。  
(1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 次の診断を受けた人。……腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。……下痢
4. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

### ● 効能・効果

■ 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労 ■ 脚気「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど服用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。」

■ 次の場合のビタミンB1の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

### ● 用法・用量

右記の量を水又はお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	3錠	3回（朝・昼・晩）
15才未満	服用しないこと	

※用法・用量を厳守してください。

### ● 有効成分とはたらき（1日量：9錠中）

有効成分	配合量	はたらき
チアミン硝酸物 （ビタミンB1硝酸塩）	30mg	ビタミン補給に加え、関節痛や神経痛などの症状を緩和します。
コンドロイチン 硫酸ナトリウム	800mg	関節軟骨内に存在し、弾力性や保水性を与える役割をしています。軟骨成分の合成を促進する作用等があり、これにより関節を健康な状態に保ち、関節痛・神経痛などを緩和します。
アスパラギン酸カリウム・ マグネシウム等量混合物	300mg	体内で必要なエネルギー源として働き、ビタミンB1の作用を助けます。
トコフェロールコハク酸エステル カルシウム（ビタミンE誘導體）	30mg	過酸化脂質の生成を抑制して血流をスムーズにすることで関節痛や筋肉痛などの症状を緩和します。

添加物：塩酸グルコサミン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、セルロース、香料

※胃の中での製剤の崩壊性を高める為に「塩酸グルコサミン」を添加物（製剤の緩衝剤）として配合しています。

### ● 保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4) 使用期限（外箱・ラベルに記載）を過ぎた製品は服用しないでください。  
なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。
- (5) 湿気により、変色など品質に影響を与える場合がありますので、下記のことにご注意ください。  
○服用のつどキャップをよくしめてください。 ○ぬれた手で触れないでください。  
○開封後は、湿気を含むおそれがありますので、ビンの中の詰め物を捨ててください。  
（詰め物は輸送時、錠剤の破損を防止するために入れてあります）



### お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望また、ご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00（土、日、祝日を除く）