

*2020年6月 改訂

服用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名:パンシロンキュアSP 胃腸薬

サッと溶けて、胃酸に速攻

(速効性制酸剤配合)

第2類医薬品

パンシロン®

キュア

胃痛+胃酸逆流などによる胸やけに

食前の空腹時にも、食後にも飲める

製品の特徴

胸やけ・こみあげる吐き気それって胃酸の逆流が原因かも!?

胃酸が出過ぎると胃の痛みが生じたり、胃酸が逆流して胸やけやむかつきが生じやすくなります。「パンシロンキュアSP」は胃酸をコントロールし、胃酸から胃を守りながら痛み・胸やけを和らげる胃腸薬です。

胃痛・胸やけにトリプルアクション®が効く!

- ① **胃酸分泌抑制作用** 胃酸分泌を促進するスイッチをブロックします。(M1 ブロッカー)
 - ② **中和作用** すでに出てしまっている胃酸を中和して、胃酸の攻撃力を弱めます。
速効性制酸剤と持続性制酸剤配合。
 - ③ **胃粘膜の保護作用** 荒れた胃粘膜を修復・保護します。
- + さらに! 健胃生薬「チンピ末」配合で、弱った胃の働きを高めます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと。
胃腸鎮痛鎮痙薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある)
4. 長期連用しないこと。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 授乳中の人
 - (3) 高齢者
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人: 排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人: 緑内障、腎臓病、甲状腺機能障害、フェニルケトン尿症*

- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状	関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	循環器	動悸	その他	目のかすみ
消化器	吐き気、胃部膨満感	泌尿器	排尿困難		

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
便秘、下痢、口のかわき
- 4.2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

■効能・効果

胃痛、胸やけ、胃酸過多、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)

■用法・用量

次の量を食前又は食後に水又はお湯で服用すること。
(用法・用量に関連する注意)用法・用量を厳守すること。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	1包	3回
15才未満	服用しないこと	

■成分・分量(3包中)

有効成分	配合量
水酸化マグネシウム	450mg
沈降炭酸カルシウム	900mg
合成ヒドロタルサイト	780mg
炭酸水素ナトリウム	240mg

有効成分	配合量
ピレンゼピン塩酸塩水和物	46.9mg
チンピ末	300mg
アルジオキサ	150mg

添加物として、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、L-アルギニン、キシリトール、軽質無水ケイ酸、ℓ-メントール、アスバルテム(L-フェニルアラニン化合物)、香料を含有する。

■保管及び取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。

お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見、ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1