


使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

# ものもらい・結膜炎の治療に 【ロート 抗菌目薬EX】

小さなお子さまにも(1歳以上)

眼科用薬・10mL  
第2類医薬品



ものもらいは、身の回りにいる細菌がまぶたの脂腺などに入り込み、ハレや炎症を起こします。結膜炎は、細菌が結膜に感染して起こることが多く、白目が充血したり、目やにが多く出たりします。

目の表面にサルファ剤が長くとどまる製剤設計。

「ロート抗菌目薬EX」は、細菌に対して  
強い抗菌力をを持つサルファ剤を配合しています。  
そして、このサルファ剤を目の表面に長くとどめる  
粘稠剤ヒプロメロースを配合し、より高い抗菌効果を目指しました。  
さらに、ビタミンE配合で、抵抗力の低下した目の血行を促し、  
ものもらい・結膜炎の治療をサポートします。  
ものもらい・結膜炎をしっかり治療したいときには  
「ロート抗菌目薬EX」。



18世紀に、日本の医学の振興を目指して翻訳された“解体新書”。その開拓の思想のもとに、  
ロートは現代人の目の疾患をあらゆる方向から見つめ直しています。現在までに培ってきた  
ノウハウと最新技術で活用される目に応えたい、その想いを「解眼新書」の文字に託しました。

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる  
**フリーアングルノズル®**



簡単にアイケアできて、とっても便利です。

**ワンタッチ式スクリューキャップ**



開ける時は左に1回カチッと回し、閉める時は右に1回カチッと回すだけ。簡単便利です。

抗ヒスタミン作用を持つクロルフェニラミンマレイン酸塩配合で、目のかゆみを抑えます。

## 使用上の注意

してはいけないこと  (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
長期連用しないでください。

### 相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人  
    はげしい目の痛み

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ち

に使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

| 関係部位 | 症 状             |
|------|-----------------|
| 皮ふ   | 発疹・発赤、かゆみ       |
| 目    | 充血、かゆみ、はれ、しみて痛い |

3.3~4日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

### 効能・効果

ものもらい、結膜炎(はやり目)、目のかゆみ、眼瞼炎(まぶたのただれ)

### 用法・用量

1回2~3滴、1日5~6回点眼してください。

### 用法・用量に関する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。  
    〔汚物や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕  
    また、混濁したもののは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先と  
目やまつ毛が  
ふれるごとのないように

### 有効成分

スルファメトキサゾールナトリウム…4.00% クロルフェニラミンマレイン酸塩……0.02%  
グリチルリチン酸二カリウム………0.15% 酢酸d<sub>4</sub>-トコフェロール(天然型ビタミンE)0.01%  
添加物として、アミノカプロ酸、ホウ酸、ホウ砂、エデト酸Na、ヒプロメロース、ベンザルコニウム塩化物、ポリソルベート80、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、pH調節剤を含有します。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、過度の高温(自動車内や暖房器具の近く等)及び過度の低温(冷蔵庫の中等)を避け、なるべく涼しい所に保存してください。
- (2) キャップを閉める際は、カチッとするとまで回して閉めてください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5) 他の人と共用しないでください。
- (6) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後は2~3ヶ月以内にご使用ください。
- (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとてご使用ください。
- (8) 容器に他の物を入れて使用しないでください。



### お問い合わせ先:お客様サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

**東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230**

受付時間9:00~18:00(土、日、祝日を除く)



ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1