

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。眼科用薬

# ロート **クリアマイルドEX<sub>a</sub>**

販売名ロートアルガードクリアマイルドEX<sub>a</sub>

【アレルギー症状が続き、かつ炎症を伴う方におすすめします】

第2類医薬品

## 製品の特徴

### クロモグリク酸ナトリウムの働き



クロモグリク酸ナトリウムは細胞膜を破れにくくすることでアレルギーの発生(ヒスタミン等の放出)を原因から抑えます。

### ブラノプロフェンの働き



炎症を起こす原因物質であるプロスタグランジンの生成を抑制し、炎症を鎮めます。

### いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる フリーアングルノズル<sup>®</sup>



簡単にアイケアできて、とても便利です。

### ワンタッチ式スクリューキャップ



開ける時は左に1回カチッと回し、閉める時も右に1回カチッと回すだけ。簡単便利です。

## 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 1 次の人は使用しないでください。  
(1)7才未満の小児 (2)妊婦または妊娠していると思われる人 (3)授乳中の人
- 2 点鼻薬と併用する場合には、乗物または機械類の運転操作をしないでください  
(眠気等があらわれることがある)



### 相談すること



- 1 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。  
(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(3)減感作療法など、アレルギーの治療を受けている人。  
(4)次の症状のある人: はげしい目の痛み (5)次の診断を受けた人: 緑内障  
(6)アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。

とくに次のような場合はアレルギーによるものとは断定できないため、使用前に医師にご相談ください。

- 片方の目だけに症状がある場合
- 目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合
- 視力にも影響がある場合

- 2 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ(目のまわりを含む)、刺激感、異物感、なみだ目、目やに、痛み
その他	息苦しさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。

- 3 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。  
 (1) 症状が悪化した場合 (2) 目のかすみ改善されない場合(緑内障などの可能性も考えられる) (3) 2日間使用しても症状がよくなる場合
- 4 症状の改善がみられても、2週間を超えて使用する場合は、医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

## 効能・効果

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和:目の充血、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)

## 用法・用量

1回1~2滴、1日4回点眼してください。

### ●用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。  
 (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。(汚染や異物混入(目やにやホコリなど)の原因となる)また、混濁したものは使用しないでください。  
 (3) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。  
 (一旦レンズを外してから点眼してください。)  
 (4) 点眼用におのみ使用してください。(5) 用法・用量を厳守してください。



## 成分・分量

有効成分	配合量
クロモグリク酸ナトリウム	1%
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.015%
プラノプロフェン	0.05%
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.2%

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、BHT、ポリソルベート80、塩酸ポリヘキサニド、pH調節剤を含有する。

## 保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40°C以上)に放置しないでください。  
 (2) キャップを閉める際は、カチッとするまで回して閉めてください。  
 (3) 小児の手の届かない所に保管してください。  
 (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)  
 (5) 他の人と共用しないでください。(6) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、保管及び取扱い上の注意に従い、2ヶ月以内にご使用ください。  
 (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼなどで軽くふきとってご使用ください。(8) 容器に他の物を入れて使用しないでください。



## お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)