

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。眼科用薬

ハード・02

レンズ装着中にも
使用できます。

目のかゆみ・結膜充血に

第2類医薬品

かゆみがつらい目に
防腐剤[®]無添加

ロトアルガード[®] クールLEX

容量13mL

クール感
持続力強化型

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人…はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人…緑内障

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合



効能・効果



- 目のかゆみ
- 結膜充血
- 眼瞼炎（まぶたのただれ）
- 目のかすみ（目やにの多いときなど）

- 眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）
- 紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）
- 目の疲れ
- ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1回1～2滴、1日3～6回点眼してください。

● 用法・用量に関連する注意

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがありますので用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛

に触れさせないでください。〔汚染や異物混入（目やにやホコリ等）の原因となる〕また、混濁したものは使用しないでください。



容器の先と目やまつ毛がふれることのないように

- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみご使用ください。

有効成分

アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物(水溶性アズレン)
配合量 0.02%

生薬由来成分で炎症を抑え、かゆみ・
充血に効果的です。紫色の薬液は
成分本来の色です。

クロルフェニラミンマレイン酸塩
配合量 0.03%

ヒスタミン(アレルギー原因物質)
をブロックし、かゆみを抑えます。

塩酸テトラヒドロゾリン
配合量 0.02%

血管を収縮させ、充血を除去します。



ビタミンB₆
配合量 0.1%

目に栄養を補給し、新陳代謝を促
進します。

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、等張化剤、アルギン酸、*l*-メントール、*d*-カンフル、
ペパーミントオイル、プロピレングリコール、ポリソルベート80、pH調節剤を含有し
ます。

※防腐剤(ベンザルコニウム塩化物、パラベン)を配合していません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に
密栓して保管してください。
品質を保持するため、
自動車内や暖房器具
の近くなど、高温の場
所(40°C以上)に放置
しないでください。※有効成分の
水溶性アズレンは光に当たると分
解して退色するので、使用後はキャ
ップをしっかり締めて添付のケース
に入れ、日光や蛍光灯に当たらない
ようにして、保管してください。**なお
水溶性アズレンの紫色は、服などに
こぼれても、水洗いで簡単に落ち
ます。**
- (2) 小児の手の届かない所
に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えない
でください。(誤用
の原因になったり品質
が変わる)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた
製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても一度
開封した後は、なるべく早くご使
用ください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の
結晶が容器の先やキャップの内
側につくことがあります。その場
合には清潔なガーゼ等で軽くふ
きとってご使用ください。
- (7) 容器に他の物を入れて使用しな
いでください。

* 製剤をとどめるため、点眼後薬
液が粘度をもつようにしております。
そのため、点眼後、視界がぼ
やけることがありますのでご注意
ください。

お問い合わせ先;お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO ロート製薬株式会社
大阪市生野区箕野1-8-1

400522904