

第3類医薬品

販売名: Vロートコンタクトプレミアム



乾き・ヒリつきによる酷使して蓄積した疲れに。
6つの原因全てにアプローチ!

◆製品特徴

- ① コンタクトならではのつらい眼疲労の6つの原因にアプローチした処方設計
- ② 全ての有効成分、基準*内最大濃度配合
- ③ 角膜ダメージ修復するビタミンAを、ロート史上コンタクト用目薬として基準*内最大濃度配合
- ④ 目が疲れてリフレッシュしたい時にうれしい、気持ちのよいさし心地

*光線などによる軽度な炎症 *基準とは厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲

角膜の傷[#]を修復し、疲れを治す

#コンタクトなどによる軽度なこすれ



◆コンタクトレンズ装用時の注意

眼の調子や体調が悪い場合は、無理に使用しないでください。コンタクトレンズ装用中に強い異物感や痛みがある場合や症状が続く場合は、レンズの使用を中止し、速やかに眼科を受診してください。

すべてのコンタクトレンズ装用中に使えます。また、レンズをはずした後にもご使用いただけます。(カラーコンタクトレンズ装用には使用しないでください。)

ソフト

ハード

O₂

使い捨て

裸眼

目薬には、ソフトコンタクトレンズ装用中に使用できるものと使用できないものがあります。ソフトコンタクトレンズを装用したまま目薬を使用する場合は、外箱や添付文書を確認し、必ず、ソフトコンタクトレンズ装用中に使用できる目薬を使用しましょう。

◆容器特徴

フリー
アンダル
ノズル[®]

どの角度からでもさしやすい



簡単にアイケアできて、とっても便利です。

ワンタッチ式
スクリュー
キャップ



開ける時は左に1回カチッと回し、閉める時も右に1回カチッと回すだけ。簡単便利です。

使用上の注意 ▲

相談すること



1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人 はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人 緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

用法・用量

1回1~3滴、1日5~6回点眼してください。

用法・用量に関する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。[汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる]また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) 点眼用にのみ使用してください。
- (4) コンタクトレンズを装着していないときも使用できます。



容器の先と
目やまつ毛が
ふれることのないように

成 分

有効成分	配合量	はたらき
全有効成分基準*内最大濃度配合	レチノールバルミチン酸エステル(ビタミンA)	50,000単位/100mL
	ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005%
	クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03%
	酢酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE)	0.05%
	タウリン	1%
	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.5%

【添加物】ホウ酸、ホウ砂、ヒアルロン酸Na、塩化Na、ポビドン、ゴマ油、l-メントール、d-カンフル、ゲラニオール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンヒマシ油、エデト酸Na、ピロ亜硫酸Na、塩酸ボリヘキサニド、pH調節剤

*基準とは厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲 ※光線などによる軽度な炎症

効能・効果

目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目にに入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、目のかゆみ

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) キャップを閉める際は、カチッとするとまで回して閉めてください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5) 他の人と共用しないでください。
- (6) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、保管及び取扱い上の注意に従い、2~3ヶ月を目安にご使用ください。
- (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとてご使用ください。
- (8) 容器に他の物を入れて使用しないでください。



お問い合わせ先:お客様安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間9:00~18:00(土、日、祝日を除く)