

ロート製薬



わかんせん®

# 補中益気湯 満量処方

ほちゅうえききとう

第2類医薬品

満量処方とは、  
日本薬局方補中益気湯の  
生薬全量(最大量)から  
エキスを得た処方です。

使用  
期限  
製造  
番号

170203201

ドリンク (15才以上)

30mL×3本

ドリンク

30mL×3本

(15才以上)

ロート製薬



わかんせん®

# 補中益気湯 満量処方

ほちゅうえききとう

つらい  
症状に!  
速効だからすぐ飲める

### 【用法・用量】

次の量を、食前又は食間によく振ってから服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人 (15才以上)	1本	3回
15才未満	服用しないでください	

食間とは…食後2～3時間をさします。

<用法・用量に関連する注意>

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)本剤は、本質的に沈殿を含んでいますので、服用前によく振ってから服用してください。

### 【効能・効果】

体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいもの次の諸症：虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感言

# 弱った身体を強くすることで 元気がない方の虚弱体質を改善する漢方

〈販売名〉新生補中益気湯内服液

第2類医薬品



### 【成分・分量】

本品1日量 90mL(30mL×3本)中  
補中益気湯濃縮液…81mL  
(下記生薬の水製抽出液)

日局ニンジン……………4g  
 日局ビャクジュツ……………4g  
 日局オウギ……………4g  
 日局トウキ……………3g  
 日局チンピ……………2g  
 日局タイソウ……………2g  
 日局サイコ……………1g  
 日局カンゾウ……………1.5g  
 日局ショウキョウ……………0.5g  
 日局ショウマ……………0.5g  
 添加物：白糖、安息香酸ナトリウム、パラベン、香料

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限(箱及びラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)開栓後はすぐにお飲みください。開栓後のものを保管しないでください。

販売名：  
新生補中益気湯内服液

押してあける

第2類医薬品

漢方製剤

この外箱は本剤とともに保管し、服用の際には必ずお読みください。

⚠【使用上の注意】

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1)医師の治療を受けている人。 (4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (5)次の症状のある人。むくみ  
(3)高齢者。 (6)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしただけでも息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒に服用する場合には5～6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

発売元：ロート製薬株式会社

大阪市生野区箕西1-8-1

製造販売元：新生薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水谷1269

お問い合わせ先：ロート製薬お客様安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見、ご要望、またご不満などを  
お聞かせいただけますか。【あなたに添えたい】サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 受付時間 9:00～18:00

大阪：06-6758-1230 (土、日、祝日も除く)

副作用被害救済制度の問合せ先  
0120-149-931