

ロート製薬

和漢箋

わかんせん®

錠剤タイプ **36錠**



原寸大

3日分
(15才以上)

ラクリア

満量処方

防己黄耆湯

ぼういおうぎとう

だるさ・痛み
を感じる

むくみ

ひざなど**関節**の痛みに

立ち仕事が続く...



冷えや
血行不良で...



〈販売名〉ラクリア

利尿作用により、余分な水分の排泄を促して
むくみや、ひざなど関節の腫れや痛みの症状を改善します。

【効能・効果】体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症:肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)

たまった
水分を
流す

第2類医薬品



パウチでエコ

満量処方とは、
日本薬局方防己黄耆湯の
生薬全量(最大量)から
エキスを得た処方です。



切り取り線

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりしめること

漢方製剤 36錠

△ 使用上の注意

■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人: むくみ
 - (6) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

- まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばわりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
- 長期運用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【用法・用量】 次の量を1日3回食前又は食間に、水又はお湯で服用すること。

年齢	1回量
成人(15才以上)	4錠
5才以上15才未満	2錠
5才未満	服用しないこと

※ 食間とは、食後2~3時間を指す。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】 12錠中 防己黄耆湯エキス3200mg(ポウイ5.0g、オウギ5.0g、ビャクジュツ3.0g、ショウキョウ1.0g、タイソウ3.0g、カンゾウ1.5gより抽出)を含む。添加物として、クロスCMC-Na、CMC-Ca、無水クイ酸、ステアリン酸Mg、タルク、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナバロウを含む。※本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いているため、錠剤の色が多少異なることがある。

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 湿気により、変色など品質に影響を与える場合があるので、ぬれた手で触れないこと。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。

副作用被害救済制度の問合せ先: 0120-149-931

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

お客さま安心サポートデスク: 06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

使用期限
製造番号アンケート
ご協力をお願い

アクセス番号をお控の上、携帯電話またはパソコンでアクセスしてください。
<https://jp.rohto.com/gran/>
【アクセス番号】0062



137503161