体質研究から 生まれた

わかんせん

Ħ 11

6客さま安心サポートデスク

お信仰にご相談とださい。

東京:03-5442-6020

大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00 (土、日、祝日を除く)

詳しい情報はHPで

www.

wakansen.com

(15才以上の場合

この外箱は、本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

【効能・効果】体力中等度以上で、精神不安があって、動悸、不眠 便秘などを伴う次の諸症:高血圧の随伴症状(動悸、不安、不眠) 神経症、更年期神経症、小児夜泣き、便秘

■してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと。 他の瀉下薬(下剤) 2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること。

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(1)医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人

(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人,体の弱い人) 提が弱く下痢しやすい人

(5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱

を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

発疹・発赤、かゆみ はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 ●まれに下起の重篤な症状が起こることがある。 その場合は直ちに医師の診療を受けること 症状の名称 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空 間質性肺炎 せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだる 肝棉能障害

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場 今には、服用を由止し、この外籍を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること、 軟便 下痢 4.1ヵ月位 (小児夜)立義 便順に服用する場合には1週間位) 原田しても症状がよくならない場合は服用 を中止し、この外籍を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【用法・用量】次の量を1日3回食前又は食間に、水又はお湯で服用すること。 成人(15才以上)…1回4錠、7才以上15才未満…1回3錠、5才以上7才未満…1回2錠

5才未満…服用しないこと ※食間とは、食後2~3時間を指す。 〈用法・用量に関連する注意〉(1) 用法・用量を敲守すること。(2) 小児に服用させる場合には、保護者の 指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】12錠中 集胡加竜骨柱動湯エキス1950mg(サイコ2.5g、ハンゲ2.0g、ブクリョウ1.5g、ケイヒ1.5g、オウコン1.25g、タイソウ1.25g、エンシ1.25g、オリイ1.25g、ショウキョウ0.4g、ダイオウ0.5g、リカーリン・フェクスを食材も一分を含む、添加物として、ステアリンを酸析の、CMC Na、セルロース・ディースターリーを終める。「Mana Water Page 1.2 を使用している。 メタケイ酸アルミン酸Mg、水酸化AI/Mg、乳糖を含む。

使用 斯娜

50 10

【保管及び取り扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない溶しい防に密栓して保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因 になったり品質が変わる)(4) 混気により 変色など品質に影響を与える場合があるので ぬれた手で触れないこと。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期間内 であっても一度間封した後は、なるべく早く使用すること。

公 志 元: D-F製業株式会社 大阪市生野区架西1-8-1

お客さま安心サポートデスク: 06=6758=1230 製造販売元: ② 大経堂薬品工業株式会社 空息星大和高田市根或林574番地

知っておきたい

漢方製剤

可作用検索を済制度の組合を集 0120-149-931