

使用前にこの説明書きを必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名:ロート養潤水α

第3類医薬品 目薬 13mL



△ 使用上の注意

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(3)次の症状のある人…はげしい目の痛み(4)次の診断を受けた人…緑内障

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持つ

て医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3.次の場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)目のかすみ
が改善されない場合(2)2週間位使用しても症状がよくならない場合

用法・用量 1回1～3滴、1日5～6回点眼する。

●**用法・用量に関連する注意** (1)用法・用量を厳守すること。なお、就寝より5分以上前の点眼をおすすめする。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないこと。〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕また、混濁したものは使用しないこと。(4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。(5)点眼用にのみ使用すること。

効能・効果 目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

成分 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム0.5%、タウリン0.5%、酢酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE)0.03%、L-アスパラギン酸カリウム0.5% 添加物としてホウ酸、ホウ砂、l-メントール、ユーカリ油、ゲラニオール、ヒアルロン酸Na、塩酸ポリヘキサニド、エデト酸Na、ポリソルベート80、pH調節剤を含有する。

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないこと。(2)キャップを閉める際は、カチッとするまで回して閉めること。(3)小児の手の届かない所に保管すること。(4)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(5)他の人と共用しないこと。(6)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。(7)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがある。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとって使用すること。(8)容器に他の物を入れて使用しないこと。

お問合せ先
コミュニケーションコール
0120-610-755
受付時間/9:00～17:00(土、日、祝除く)