

なみだ[®]ロート コンタクト

コンタクト対応涙液型目薬

13mL

なみだ[®]ロートコンタクトは…



すべてのコンタクトレンズに使用できます。
また、レンズをはずした後にもご使用いただけます。

特 長

- **コンタクトレンズをつけたまま使用できるので、手軽で便利です。**
コンタクトレンズに吸着しない成分だけでできているので、従来、薬剤がレンズをいためる恐れがあったソフトコンタクトレンズもつけたまま、安心して使用することができます。
- **なみだに近い成分で、目にやさしくうるおいを与えます。**
コンタクトレンズ装着時の乾燥による、目の疲れ、かすみ、ゴロゴロとした不快感などには、なみだが重要な役割を果たします。
「なみだ[®]ロート**コンタクト**」は、〈ヒドロキシエチルセルロース(HEC)〉配合の涙液型目薬なので、なみだの中の水分を蒸発しにくくし、瞳をしっとりいやして快適にします。

使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人: はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人: 緑内障
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 目のかすみ改善されない場合
 - (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量

1回1～2滴、1日5～6回点眼してください。

■用法・用量に関連する注意

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
(汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる)また、混濁したものは使用しないでください。
- (3)点眼用にのみ使用してください。
- (4)コンタクトレンズを装着していないときも使用できます。



容器の先と
目やまつ毛が
ふれることのないように

有効成分

塩化カリウム	0.08%
塩化ナトリウム	0.44%
ヒドロキシエチルセルロース(HEC)	0.07%

※添加物として、ホウ酸、ホウ砂、ポリオキシエチレンポリオキシシロピロビングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エデト酸Na、ソルビン酸K、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。
その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (7)容器に他の物を入れて使用しないでください。



お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

O-ト製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1