

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。眼科用薬



目のかゆみ・結膜充血に

第2類医薬品

ロートアルゲート[®] クールEX

容量13mL

かゆみがつらい目に
防腐剤[※]無添加

クール感
持続力強化型

容器特徴

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる
フリーイングルノズル[®]



簡単にアイケアできて、とっても便利です。

使用上の注意 !



相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人…はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人…緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販

売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3.次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

- 目のかゆみ ●結膜充血
- 眼瞼炎(まぶたのただれ)
- 目のかすみ(目やにの多いときなど)
- 眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)

- 紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)
- 目の疲れ
- ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1回1~2滴、1日3~6回点眼してください。

●用法・用量に関する注意

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがありますので用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛

に触れさせないでください。〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕また、混濁したものは使用しないでください。

- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみご使用ください。



容器の先と
目やまつ毛が
ふれることの
ないように

有効成分

アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物(水溶性アズレン)
配合量 0.02%

生葉由来成分で炎症を抑え、かゆみ・
充血に効果的です。紫色の薬液は
成分本来の色です。

クロルフェニラミンマレイン酸塩
配合量 0.03%

ヒスタミン(アレルギー原因物質)
をブロックし、かゆみを抑えます。

塩酸テトラヒドロゾリン
配合量 0.02%

血管を収縮させ、充血を除去します。


ビタミンB₆
配合量 0.1%

目に栄養を補給し、新陳代謝を促
進します。

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、等張化剤、アルギン酸、 α -メントール、d-カンフル、
ペパーミントオイル、プロピレンジコール、ポリソルベート80、pH調節剤を含有し
ます。
※防腐剤(ベンザルコニウム塩化物、パラベン)を配合していません。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に
密栓して保管してください。



品質を保持するため、
自動車内や暖房器具
の近くなど、高温の場
所(40°C以上)に放置
しないでください。※有効成分の
水溶性アズレンは光に当たると分
解して退色するので、使用後はキャ
ップをしっかりと締めて添付のケース
に入れ、日光や蛍光灯に当たらない
ようにして、保管してください。なお
水溶性アズレンの紫色は、服などに
こぼれても、水洗いで簡単に落ち
ます。

(2) 小児の手の届かない所
に保管してください。



(3) 他の容器に入れ替えな
いでください。(誤用
の原因になったり品質
が変わる)

(4) 他の人と共用しないでください。

(5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた
製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても一度
開封した後は、なるべく早くご使
用ください。

(6) 保存の状態によっては、成分の
結晶が容器の先やキャップの内
側につくことがあります。その場
合には清潔なガーゼ等で軽くふ
きとてご使用ください。

(7) 容器に他の物を入れて使用しな
いでください。

* 製剤をとどめるため、点眼後薬
液が粘度をもつようにしておりま
す。そのため、点眼後、視界がぼ
やけることがありますのでご注意
ください。

お問い合わせ先:お客様安心サポートデスク

この商品をお使いになつてのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

400522905