



メンソレータム® エクシブ® EX クリーム

第2類医薬品

水虫は治せる!
きちんと治療して
清潔でキレイな素足へ!

水虫は一度なってしまったら治せないと思っていませんか? もしそうなら、それは、効果的な治療ができていなかったか、水虫菌が完全に死滅する前に治療をやめてしまい、再発してしまったなどの理由が考えられます。

効果的な治療をしっかりと続ければ、水虫はきちんと治すことができます。メンソレータム®エクシブ®EXクリームで正しく効果的に治療して、清潔な素足を目指しましょう。

清潔感あふれる

さわやかな
せっけんの
香り

1

深部まで浸透
水虫菌を破壊

優れた殺菌力を持つ
テルビナフィン塩酸塩が
角質層の奥の水虫菌も破壊

2

かゆみ止め成分
トリプル配合

3つのかゆみ止め成分が
しつこいかゆみに効きます
〔「クロルフェニラミンマレイン酸塩」
〔クロタミトン〕「リドカイン」〕

5

24時間
効果が持続
(1日1回で効く)

エクシブの
5つのはたらき

3

皮めくれ・水ぶくれも
キレイに!

水虫による炎症にはたらく
抗炎症成分(グリチルレチン酸)配合

4

足のニオイの元となる
菌まで殺菌

イソプロピルメチルフェノール

[水虫治療のポイント]

1. 清潔に保つ

清潔是水虫治療の第一条件です。患部はせっけんでよく洗い、いつもすっきり清潔に保ちましょう。

2. しっかり乾燥

水虫菌は乾燥が苦手です。汗をかいたりぬれたりした後は、タオルで患部を拭いてしっかり乾燥させましょう。

3. 薬は患部の周囲にも塗る

水虫菌は、症状があらわれている範囲より広く潜んでいることが多いため、薬は患部を中心に、広めに塗りましょう。薬の塗布は皮フがやわらかくなっているお風呂上がりがおすすです。

4. 根気強く治療を続ける

水虫菌はしつこい菌です。症状が治まり、治ったかな?と思ってても水虫菌は死滅していないことが多く、再発の原因になります。根治するためには、症状が治まったと思って一、二ヶ月の間は治療を続けましょう。

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

水虫・たむし用薬 【販売名】メンソレータムエクシブEXクリーム **第2類医薬品**

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください。本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等

(2) 湿疹 (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 乳幼児 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 患部が顔面、又は広範囲の人 (6) 患部が化膿している人 (7) 「湿疹」か「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人 (陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等の原因による場合が多い)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮フ	かぶれ、刺激感、熱感、鱗屑・落屑(フケ、アカのような皮フのはがれ)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮フの亀裂、痛み、色素沈着、発疹・発赤*、かゆみ*、はれ*、じんましん*

*: 全身に発現することもあります。

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能】 水虫、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】 1日1回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 定められた用法を厳守してください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。
- (6) 本剤のついた手で目や粘膜に触れないでください。

【成分・分量】 テルピナフィン塩酸塩 1.0g、イソプロピルメチルフェノール 1.0g、クロロフェニラミンマレイン酸塩 0.5g、クロタミトン 1.0g、リドカイン 2.0g、グリチルレチン酸 0.5g
(100g中) 添加物として、ワセリン、流動パラフィン、パルミチン酸イソプロピル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、セタノール、カルボキシビニルポリマー、水添大豆リン脂質、ステアリン酸ソルビタン、ヒドロキシエチルセルロース、pH調節剤、エデト酸Na、BHT、ヒアルロン酸Na、エタノール、香料を含有する

【保管及び取扱上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先: お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京: **03-5442-6020** 大阪: **06-6758-1230**

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1
MADE IN JAPAN

402160101