

ロート子どもソフト

第3類医薬品

目ぐすり 8mL

それは、たいせつなお子さまの目をまもる
「しみないタイプの目ぐすり」



キャップの開閉方法

キャップの開け方
キャップを手前に
ひねってください。



キャップの閉め方
カチッと音がするまで
押し下けてください。



*容器全体を支えるように持ち、キャップを上にして開閉してください。
容器の中央部分だけを持って開閉すると、薬液がとびだしてもれることがあります。

- デリケートなお子さまの目をいたわりながら、かゆみや炎症を穏やかにしずめます。
- ゴミやほこり・花粉などの異物を取り除いて、眼病を予防します。
- カルキを中和するタウリン配合で、水泳後の目の塩素刺激をやさしく緩和します。
- ソフトでしみないさし心地にするために、pH値を涙とほぼ同じにしました。
- 無着色・無香料・非刺激性の目薬で、四ヶ月のお子さまからお使いいただけます。

こどもの目の機能は6歳頃でほぼ完成することを、ご存知ですか？

でも、まだ未熟な面もあって

いつもは元気な子ども、なぜかひいたときや体力が落ちている時などにはウイルスや細菌、ほこりに負けて目に炎症を起こしたり、目やにが多くなることがあります。

上手なめくすりのさしかた



でも、じょうずに伝えられなくて

ゴミやほこりが目に入っても、痛みやムズムズ感を伝えられず、つい手でこすってしまい目が真っ赤に…。小さなほこりが原因で思わぬトラブルを引き起こすなんてことも。



子どもの目のまわりをふいてから目頭に目薬を2~3滴おとしてまばたきさせると自然に液が目に入ります。

ティッシュなどで目のまわりをふいた後、軽く目頭を押さえて、1分程目を閉じているのが効果的です。

⚠️ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人: はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人: 緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持つ

て医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみ改善されない場合
- (2) 2週間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、結膜充血、目のかゆみ、目の疲れ、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかすみ(目やにの多いときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

有効成分

アミノエチルスルホン酸(タウリン)
配合量:1%

プールの消毒剤(カルキ)による目の刺激を緩和して、眼病を予防します。

クロルフェニラミンマレイン酸塩
配合量:0.03%

充血や目のかゆみをきちんと鎮めます。

ビタミンB6
配合量:0.05%

目に栄養を補給し、新陳代謝を促進します。

L-アスパラギン酸カリウム
配合量:0.2%

目の細胞呼吸を活発にして目の疲れを癒します。

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、pH調節剤を含有します。
※防腐剤(ベンザルコニウム塩化物、パラベン)を配合していません。

用法・用量

15才未満:1回2~3滴、1日5~6回点眼してください。

用法・用量に関連する注意

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

なお、小さなお子さま(4ヶ月以上)にもご使用いただけます。

(2)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕

また、混濁したものは使用しないでください。

(3)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。

(4)点眼用에만使用してください。



容器の先と目やまつ毛がふれることのないように

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)

(4)他の人と共用しないでください。

(5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。

(6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。

(7)容器に他の物を入れて使用しないでください。

(8)誤用をさけるため、使用済みの空容器は捨ててください。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京: **03-5442-6020** 大阪: **06-6758-1230**

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)