

服用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

第2類医薬品

のみすぎ・食べすぎ・胸やけ・胃痛に

パンシロン[®]


胃腸薬

パンシロンは、制酸剤、消化剤、健胃剤をバランスよく配合。
のみすぎ、食べすぎ、胸やけ、胃痛などによく効きます。

特長

- のみすぎ、食べすぎで疲れた胃に
健胃生薬が弱った胃の働きを回復させるとともに、消化酵素の働きで食物の消化を助け、胃の負担を軽くします。
- 胸やけ、胃痛をスーッと鎮めます。
速効性制酸剤と持続性制酸剤の配合で、胃酸の出すぎからくる胸やけ、胃痛、むかつきなどの不快症状を抑えます。
- 爽やかな香りの、のみやすい細粒です。
生薬独特の爽やかな香りの細粒剤ですから、胃の調子が悪い時でも無理なく服用していただけます。

— こんな方に **パンシロン**。



使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください。
透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある)
4. 長期連用しないでください。

👨🏻‍⚕️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠

していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 次の症状のある人: 排尿困難 (6) 次の診断を受けた人: 腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
口のかかわき

4.2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

■効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、胃もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐、飲みすぎ、胃痛、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べすぎ

■用法・用量

次の量を食後に水又はお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15才以上	1包	3 回
11才以上15才未満	2/3包	
8才以上11才未満	1/2包	
5才以上8才未満	1/3包	
5才未満	服用しないこと	

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■有効成分(3包中)

	有効成分	配合量		有効成分	配合量
制酸剤	サナルミン	399mg	消化酵素	ピロチアスターゼ500	210mg
	炭酸水素ナトリウム	1950mg		プロザイム	18mg
	重質炭酸マグネシウム	555mg	健胃生薬	ケイヒ	78mg
	沈降炭酸カルシウム	540mg		シユクシャ	144mg
	ロートエキス	30mg		センブリ	3mg
			ケイヒ油	7mg	

添加物として、ℓ-メントール、トウモロコシデンプン、デキストリン、ケイ酸Aℓを含有します。

■保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

- (5) 1包を分けて服用したときの残りは、袋の口を折り返して封をするように閉じ、2日以内に使用してください。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけますか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1