


服用前にこの説明書を必ずお読み下さい。また、必要なときに読めるよう保管して下さい。

イブプロフェン配合
ロート総合感冒薬 新ユア® IB (錠)

のどの痛み・発熱・せきに 第2類医薬品

熱をさげ、
のどの痛みをやわらげる
イブプロフェン

せきを鎮め、
たんを出しやすくする
dl-メチルエフェドリン塩酸塩
グアヤコールスルホン酸カリウム



かぜのとき消耗しやすい
ビタミンを補う

リボフラビン・チアミン硝化物

くしゃみ・鼻みず
鼻づまりを抑える

d-クロロフェニラミンマレイン酸塩

緩衝作用により胃を守る
グリシン



[使用上の注意]



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないで下さい。
 - (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 15才未満の小児
 - (4) 出産予定日12週以内の妊婦*
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する
内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
(眠気等があらわれることがある)
4. 服用前後は飲酒しないで下さい。
5. 5日間を超えて服用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、緑内障、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病
 - (8) 次の病気にかかったことのある人。 胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、青あざができる
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃痛、胃部不快感、口内炎、胸やけ、胃もたれ、胃腸出血、腹痛、下痢、血便
精神神経系	めまい
循 環 器	動悸
呼 吸 器	息切れ
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	目のかすみ、耳なり、むくみ、鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、背中痛み、過度の体温低下、からだがだるい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮ふの広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少*、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
無菌性髄膜炎	首筋のつばりを伴った激しい頭痛、発熱、吐き気・嘔吐等の症状があらわれる。(このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている)
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮ふや粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

便秘、口のかわき、眼気
4.5～6回服用しても症状がよくなる場合(特に熱が3日以上続いたり、また、熱が反復したりするとき)は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

効能・効果 かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量 次の量を食後なるべく30分以内に水又はお湯で服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	3錠	3回
15才未満	服用しないこと	



(1) 用法・用量を厳守して下さい。

(2) 錠剤の取り出し方

図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)

成分・分量 (1日量9錠中)

	有効成分	分量
解熱鎮痛剤	イブプロフェン	450mg
気管支拡張剤	dL-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg
鎮咳剤	チベジンヒベンズ酸塩	75mg
去痰剤	グアヤコールスルホン酸カリウム	250mg
抗ヒスタミン剤	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg
カフェイン剤	無水カフェイン	75mg
ビタミン剤	リボフラビン(ビタミンB ₂)	12mg
	チアミン硝化物(ビタミンB ₁ 類)	25mg
胃粘膜保護剤	グリシン	180mg

●添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、セルロース、乳糖、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、タルク、酸化チタン、大豆レシチン、三二酸化鉄を含有します。

※本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、リボフラビン(ビタミンB₂)によるもので、心配ありません。

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かないところに保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないで下さい。なお、使用期限内であっても一度内袋を開封した後は、なるべく早くご使用下さい。

お問い合わせ先: お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになったのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけます。「あなたに届けたい」サポートデスクです。
東京: 03-5442-6020 大阪: 06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO ロート製薬株式会社
大阪市生野区箕野1-8-1

400693403