

服用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。 ビタミンAD主薬製剤

販売名:Vロートナイトプレミアム アイ内服薬

第2類医薬品

足りないビタミンAを補い 夜の見えづらさ(夜盲症)に飲んで効く!!

VロートナイトPREMIUM アイ内服薬

◆製品特徴

知っていましたか?

一般的にビタミンAが不足すると
暗いところで目が慣れにくくなると
言われています…。

「Vロートナイトプレミアム アイ内服薬」は、
そんな足りないビタミンAを補うことで、
夜間の視力の維持を助けます。

夜のこんな症状でお悩みの方に…



夜間の運転時見えづらい…



暗がりの階段で見えづらい…

使用上の注意 ▲

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊娠3ヵ月以内の妊婦、妊娠していると思われる人又は妊娠を希望する人
(妊娠3ヵ月前から妊娠3ヵ月までの間にビタミンAを1日10,000国際単位以上摂取した妊婦から生まれた児に先天異常の割合が上昇したとの報告がある。)
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。 下痢、便秘
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- 服用後、生理が予定より早きたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

効能・効果

- 夜盲症(とり目、暗所での見えにくさ) ●次の症状の緩和:目の乾燥 ●骨歯の発育不良 ●くる病の予防
- 次の場合のビタミンADの補給:妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、発育期、老年期

用法・用量

次の量を水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2カプセル	1回
15歳未満	× 服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)カプセルの取り出し方:図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。またPTPシートは1つずつ切り離さないでください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成分(2カプセル中)

有効成分	配合量	はたらき
ビタミンA油(ビタミンAとして)	4mg(4000IU)	夜間の視力維持を助けます
コレカルシフェロール(ビタミンD ₃ として)	0.01mg(400IU)	カルシウムの吸収を助け、骨の発育を促進します
酢酸d-α-トコフェロール(ビタミンE誘導体)	100mg	抗酸化作用により、細胞の正常な働きを助けます
ビスベンチアミン(ビタミンB ₁ 誘導体)	28.57mg	エネルギーの産生を助け、筋肉や神経の働きを円滑にします
アスコルビン酸カルシウム(ビタミンCカルシウム)	60.52mg	目の周り等の皮膚や粘膜の正常な働きを助けます

添加物:ゴマ油、サラシミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、中鎖脂肪酸トリグリセリド、コハク化ゼラチン、濃グリセリン、酸化チタン、カラメル

保管及び取扱上の注意

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- 2.小児の手の届かないところに保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- 4.使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても一度内袋を開封した後は、なるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに届けたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1