


使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

ロート 抗菌目薬EX

眼科用薬・10mL
第2類医薬品

ものもらい・結膜炎の治療に

小さなお子さまにも*



ものもらいは、身の回りにいる細菌がまぶたの脂腺などに入り込み、ハレや炎症を起こします。結膜炎は、細菌が結膜に感染して起こることが多く、白目が充血したり、目やにが多く出たりします。

原因菌の繁殖を抑える
サルファ剤

炎症を鎮める
グリチルリチン酸二カリウム

かゆみを止める
抗ヒスタミン作用を持つ
クロルフェニラミンマレイン酸塩

血行を促す
天然型ビタミンE

目の表面に有効成分が長くとどまる滞留性設計

睡眠不足や疲れ等により抵抗力が落ちていたりすると
ものもらいや結膜炎などを引き起こしやすくなります。
ものもらい・結膜炎には「ロート抗菌目薬EX」とたっぷりの休息を。

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる
フリーアングルノズル®



簡単にアイケアできて、とっても便利です。

ワンタッチ式スクリューキャップ



開ける時は左に1回カチッと回し、閉める時も右に1回カチッと回すだけ。簡単便利です。

*1歳以上

使用上の注意

してはいけないこと  (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
長期連用しないでください。

相談すること 

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人
　　はげしい目の痛み

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ち

に使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症　状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3.3~4日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

ものもらい、結膜炎(はやり目)、目のかゆみ、眼瞼炎(まぶたのただれ)

用法・用量

1回2~3滴、1日5~6回点眼してください。

用法・用量に関する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
　　〔汚物や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕
　　また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先と
目やまつ毛が
ふれるごとのないように

有効成分

スルファメトキサゾールナトリウム…4.00% クロルフェニラミンマレイン酸塩……0.02% グリチルリチン酸二カリウム………0.15% 酢酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE)0.01% 添加物として、アミノカプロン酸、ホウ酸、ホウ砂、エデト酸Na、ヒプロメロース、ベンザルコニウム塩化物、ポリソルベート80、ポリオキシエチレンボリオキシプロピレングリコール、pH調節剤を含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、過度の高温(自動車内や暖房器具の近く等)及び過度の低温(冷蔵庫の中等)を避け、なるべく涼しい所に保存してください。
- (2) キャップを閉める際は、力ちつとするまで回して閉めてください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5) 他の人と共用しないでください。
- (6) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後は2~3ヶ月以内にご使用ください。
- (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとてご使用ください。
- (8) 容器に他の物を入れて使用しないでください。



※点眼により口中に苦味を感じることがありますが、薬液が涙道を通って流れでてくるため、無害ですから心配ありません。

お問い合わせ先:お客様安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間9:00~18:00(土、日、祝日を除く)



ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1