



服用前にこの説明書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう保管して下さい。
販売名:スラーリア便秘内服液 瀉下薬

第3類医薬品

スラーリア[®] WASH OUT WATER

I Promise You to Reset Inner Body.
Say Good-Bye to Constipation,
Hello to Refreshing Body & Smooth Skin.

WATER CONTROL

ウォーターコントロール[®]とは・・・

ミネラルのはたらきで腸内に
水分を移行させるしくみのこと。
水のチカラを利用して、やわらかくした便を
洗い出すというメカニズムなので、
スムーズな排出実感が期待できます。



肌あれによい
ビタミンB6配合



GRAPEFRUIT FLAVOR


スッキリ飲みやすいグレープフルーツ味。
冷やして飲むと、より飲みやすくなります。

STEP1
マグネシウムが
浸透圧を
UP

STEP2
腸内に水分が
移行してくる

STEP3
便を洗い出して
スッキリ!

ウォーターコネクタ[®](水分誘引力)を
高める工夫がされた処方設計です。 洗い出す力が高い処方ですが、
効き目の強さはご自分の症状の程度にあわせて
調節いただくことができます。



△ 使用上の注意

してはいけないこと ☒

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起これやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。
他の瀉下薬(下剤)

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- 次の症状のある人はげい腹痛、吐き気・嘔吐
- 次の診断を受けた人 腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

関係部位	症状
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。下痢

4. 1週間間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

効能・効果

○便秘 ○便秘に伴う次の症状の緩和:肌あれ、吹出物、腹部膨満、食欲不振(食欲減退)、腸内異常醗酵、頭重、のぼせ、痔

有効成分 100mL中

有効成分	配合量	作用
硫酸マグネシウム水和物	5000mg	腸管に水分を移行させます
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	5mg	肌あれや吹出物に効果的です

添加物:リポフラビンリン酸エステルNa(ビタミンB2リン酸エステル)、デキストリン、グリセリン、D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸Na水和物、安息香酸Na、エタノール、パラベン、香料

用法・用量

次の量を空腹時に服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	50~100mL	1回
15才未満	服用しないこと	


初回は最小量の50mLでお試し下さい。その後、便通の具合や状態を見ながら少しずつ増量又は減量して下さい。 ※必ず添付の目盛り付きカップで計ってお飲み下さい。

(用法・用量に関連する注意)

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)目盛り付きカップは、ご使用のつど水洗い等して常に清潔に保管して下さい。

スッカリ体感チャート

※このチャートの服用量はあくまでも目安です。最小量から、段階的に用量を増やしてご自分に合った服用量を見つけて下さい。



飲み方のアドバイス

どんな
症状に
?

おなかのぼっこりが気になる、吹き出物が出てきた、おなかが悪くて食欲も出ないなど、便秘による悪いサイクルから抜け出したいときにお使い下さい。

どんな
場面
で
?

はやい方は約1~2時間で効果があらわれるなど、そのあらわれかたにも個人差がありますので、お手洗いにに行ける状態(自宅など)のご使用をおすすめします。

どのくらい
の量
?

まずは最小量の50mLからはじめ、症状に合わせて20~30mLずつ増やすなどして、ご自分にあったスッカリできる量を見つけて下さい。上記の「スッカリ体感チャート」をご参考下さい。

効果的な
飲み方
は
?

ウォーターコントロール作用には水のはたらきが関わっていますので、服用後に水又はお湯を飲むとより効果的です。また、必ず空腹時に服用してください。服用後しばらく(30分以上)は食事控えることをおすすめします。

効果的な
時間帯
は
?

本品は空腹時に服用する必要があります。例えば、朝起きてすぐ(前回の食事からの時間が一番長いと思われ、腸の活動が始まる)の服用などをおすすめします。

服用後
におなか
が
鳴る
?

薬液が腸に届いて腸が動き出したサインと思われる。その結果、腸に水や空気が送りこまれ、まれにおなか張ることがありますが、この症状は排便とともに改善されます。

保管及び取扱上の注意

- (1)光(日光や室内灯など)の当たらない涼しいところに密栓して保管して下さい。
 - (2)小児の手の届かないところに保管して下さい。
 - (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる)
 - (4)使用期限(外箱・ラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- なお、使用期限内であっても一度開封した後は冷蔵庫に保管し、3ヶ月以内にご使用下さい。ただし、混濁等異常が見られた場合は使用しないで下さい。
- (5)落下すると危険ですので、お取扱いの際には瓶本体をお持ち下さい。
 - (6)瓶はワレモノです。凍らせないで下さい。

If you want more information, access to...

<http://www.slaria.com/>

スラーリアドットコムにて、詳しい情報を公開中!

飲み方などを含め、製品についてのご質問は右記のサポートデスクまでお気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、また、ご不満点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020

大阪:06-6758-1230

受付時間9:00~18:00(土、日、祝日を除く)